

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Notas sobre una colección de aves de la isla de Martín García (Parte 1a.)

Dabbene, R.  
1917

Cita: Dabbene, R. (1917) Notas sobre una colección de aves de la isla de Martín García (Parte 1a.). *Hornero* 001 (01) : 029-034

- C — Que prefieren las zarzas y matorrales ..... *Trogloditidae*
- D — Que prefieren varillas y espadañas .....  
 aaa — En lugares secos ..... Gen. *Alectrurus* y *Emberizoides*  
 bbb — „ „ húmedos y albercas ..... Gen. *Fluvicola* y *Arundinicola*

Por este sistema, ampliando cada uno según sus conocimientos y reformando según su parecer, se puede obtener una clasificación biológica interesante.

---

## NOTAS SOBRE UNA COLECCION DE AVES DE LA ISLA DE MARTÍN GARCÍA

POR


ROBERTO DABBENE.

---

La isla de Martín García pertenece a la República Argentina, y está situada en el nacimiento del Río de la Plata, en latitud 34° S. próximamente, y longitud 38° 15' W. de Greenwich; distando 3500 metros de la costa uruguaya y 11.000 de la argentina. Tiene poco más de 2000 metros de longitud y alrededor de 1800 metros de anchura, siendo su mayor elevación de unos 215 pies. Cerca de la costa está cubierta por bosques de ceibos y de sauces, y en el interior hay pequeñas matas de arbustos espinosos y pequeños campos. Su terreno es rocoso y pertenece a la misma formación del de la costa uruguaya.

Actualmente la isla está destinada a presidio por causas militares leves, y es también un depósito de materiales explosivos de la marina.

Debido a la amable invitación del comandante militar de la isla, capitán de fragata don EDUARDO RAMÍREZ, el Museo Nacional de Historia Natural pudo enviar el preparador señor don ANTONIO POZZI, quien en los meses de Diciembre 1916 y Enero 1917, hizo una pequeña colección de aves de la isla,



y reunió algunos datos sobre diferentes especies que no pudo conseguir durante su corta estadía.

Las especies coleccionadas y observadas, son las indicadas en la lista que sigue:

### ORDEN COLUMBIFORMES.

(Palomas)

#### I. [**Picazurus** (1) **picazuro picazuro** (TEMMINCK).

(PALOMA TURCA)

*Columba picazuro* TEMMINCK, Hist. Nat. Fig. et Gall., I, pp. 411. 449 (1813—fundada sobre «Paloma Picazuro», AZARA, Apunt. Hist. Nat. de los Pájaros del Paragnay y Río de la Plata, III, 1805, p. 4, N.º CCCXVII—Paraguay) descr. orig.

(1) *Picazurus* DES MURS in CHENU, Enc. d'Hist. Nat., Ois., VI, 1854, p. 39; tipo por tautonomía, *Columba picazuro* TEMMINCK. Cf. RIDGWAY, Birds North and Middle Amer., pt. VII, 1916, p. 281.

*Columba loricata* GOULD in DARWIN, Zoology of the voyage of the «Beagle», 1841, p. 115 (cerca de Maldonado).

*Columba picazuro* BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 274 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — SALVADORI, Cat. Birds Brit. Mus., XXI (1893), p. 271 [Uruguay: Maldonado — BURNETT y FITZROY, DARWIN; Uruguay — ALAN PEEL in Mus. Brit.]. — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 201. (Uruguay).

Esta forma ha sido vista varias veces en los bosques de la isla, pero el señor ANTONIO POZZI, no ha traído ningún ejemplar.

Varios ejemplares ( $\begin{smallmatrix} \triangle & \triangle \\ \circ & \circ \end{smallmatrix}$  y  $\begin{smallmatrix} \circ & \circ \\ + & + \end{smallmatrix}$ ) de las Palmas, Chaco Austral, coleccionados en Junio y Julio por el señor JUAN MOGENSEN, pertenecen también a esta forma, la cual se distingue de *Picazurus picazuro venturiana* (HARTERT) de Tucumán, Salta y Bolivia, por tener las partes superiores del cuerpo, las cobijas del ala y el abdomen más claros].

## 2. *Zenaida auriculata auriculata* (DES MURS).

(PALOMA TORCAZ)

*Peristera auriculata* DES MURS in GAY, Hist. física y política de Chile, Zoología, I, p. 381, pl. 6 (1817 — Chile «se halla en las provincias centrales de la República») descr. orig.

*Zenaida maculata* BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 275 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — GIBSON, The Ibis, fifth ser., vol. III, N.º XI, July 1885, p. 282 (Paysandú, Uruguay). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 202 (Arroyo Grande, Río Negro, Santa Elena, San José, Uruguay).

No. 8965 a.  $\begin{smallmatrix} \triangle \\ \circ \end{smallmatrix}$  ad. Isla de Martín García, Diciembre 5, 1916. — ANTONIO POZZI.

Ala: 148 mm.; cola: 95 mm.; culmen expuesto: 15 mm.

Iris castaño.

## 3. *Columbina* <sup>(1)</sup> *picui picui* (TEMMINCK).

(TÓRTOLA, URPILITA, PALOMITA)

*Columba picui* TEMMINCK, Hist. Nat. Pig. et Gall., I, pp. 435, 498 (fundada sobre «Paloma picui» AZARA, Apunt., etc., III, 1805, p. 23,

(1) *Columbina* SPIX, Av. Bras., II, 1825, p. 57; tipo, *Columbina strepitans* SPIX, por designación de GRAY 1841, reemplaza *Columbula* BONAPARTE, Compt. Rend. XI, 1825, p. 22. Cf. TODD, Ann. Carnegie Mus., VIII, March 1913, p. 515.

N.º CCCXXIV — «Paraguay y al sur del Río de la Plata»). descr. orig.

*Columbula picui* BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 275 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) (nidificación y costumbres). — GIBSON, The Ibis, fifth ser., vol. III, N.º XI, July 1885, p. 282 (Paysandú, Uruguay). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 202 [Montevideo].

N.º 8965 *b.* ♂ ad. Isla Martín García, Enero 12, 1917. — ANTONIO POZZI.  
Iris blanco violáceo.

N.º 8965 *c.* ♀ ad. Isla Martín García, Enero 12, 1917. — ANTONIO POZZI.  
Iris blanco violáceo.

#### 4. *Leptoptila ochroptera chloroauchenia* (GIGLIOLI Y SALVADORI).

(PALOMA MONTARAZ)

[*Leptoptila ochroptera* PELZELN, Zur Orn. Bras., iii, p. 278 (1869 — fundada sobre *Columba rufaxilla* WAGLER, nec RICHM. y BERN., etc — S. E. Brasil; loc. típica fijada: Sapitiba, Río Janeiro, auct. HELLMAYR.)].

*Leptoptila chloroauchenia* GIGLIOLI e SALVADORI, Atti R. Ac. Sc. Torino, V, p. 274 (1870 — *Estancia Trinidad*, cerca de Montevideo, Uruguay) descr. orig.

*Leptoptila chalcauchenia* BARROWS, The Auk, I, No. 3, July 1884, p. 275 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

*Egyptila chalcauchenia* APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 202 (costa del Río Negro, Arroyo Grande y Santa Elena, Uruguay).

N.º 8965 *d.* ♀ no completamente adulta. Isla Martín García, Diciembre 6, 1916. — ANTONIO POZZI.  
Iris castaño.

Este ejemplar es más bien pequeño y carece del verde metálico en las plumas de la parte posterior del cuello.

Ala: 148 mm.; cola 109 mm.; culmen expuesto: 18 mm. Parece intermediario entre *Leptoptila ochroptera ochroptera* PELZ. y *Leptoptila o. chloroauchenia* GIGL. y SALVAD.

ORDEN RALLIFORMES.

( Gallaretas, Gallinetas, Burritos, etc. )

5. [ **Pardirallus** <sup>(1)</sup> **rytirhynchus** **rytirhynchus** (VIEILLOT).

( GALLINETA )

*Rallus rytirhynchus* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XXVIII, p. 549 (1819—fundada sobre «Ypacahá pardo» AZARA, Apunt., etc., III, 1805, p. 220, N.º CCCLXXII — *Paraguay*) descr. orig.

*Rallus rhytirhynchus* BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 276 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

*Rallus rhytirhynchus* APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 203 (Uruguay).

Observada en distintas ocasiones en la isla ].

6. **Aramides** **chiricote** (VIEILLOT).

( CHIRICOTE )

*Rallus chiricote* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XXVIII, p. 551 (1819—fundada sobre «Ypacahá chiricote». AZARA, Apunt., etc., III, 1805, p. 214, N.º CCCLXVIII — *Paraguay*) descr. orig.

N.º 8965 e. ♀ ad. Isla de Martín García, Diciembre 12, 1916—ANTONIO POZZI.

Iris y párpados rubí, pico verde, más claro en la extremidad; tarsos y dedos carmín rosado.

Este ejemplar carece de la mancha rojiza en la nuca, la cual tiene un ligero tinte gris pardo. En dos ejemplares de la colección del Museo Nacional, procedentes de Corrientes, la mancha rojiza está bien marcada. En uno de Misiones obtenido en el mes de Noviembre y en otro de Orán, Salta, cazado en Diciembre, la misma mancha es mucho menos pronunciada, aunque distinguible, y en fin, en uno procedente de Sapucay, Paraguay, coleccionado en el mes de Noviembre por W. FOSTER, toda la parte superior de la cabeza hasta la nuca, es rojiza y fuertemente en contraste con el color apizarrado de la parte posterior del cuello.

---

(1) *Pardirallus* BONAPARTE, C. R., xliii, p. 599 (1656), reemplaza *Linnopardalus* CAB., Journ. f. Ornith., 1856, p. 428. Cf. BRABOURNE and CHUBB, The Birds of South Amer., I, 1912, p. 22.

Es, probablemente, la primera vez que esta especie ha sido obtenida en un punto tan meridional; aunque AZARA dice que la oyó cantar en el Riachuelo de Buenos Aires.

El señor ANTONIO POZZI ha visto otro ejemplar que no ha podido obtener; probablemente era el macho.

### 7. *Fulica leucoptera* VIEILLOT.

(GALLARETA DE ALAS BLANCAS)

*Fulica leucoptera* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat. XII, p. 48 (1817—fundada sobre «Focha». AZARA, Apunt., etc., III, 1805, p. 472, N.º CCCCXLVII — *Paraguay y Buenos Aires*) descr. orig.

*Fulica leucoptera* APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 205 (Uruguay).

N.º 8965 f. ♀ no enteramente adulta. Isla de Martín García, Diciembre 6, 1916.— ANTONIO POZZI.

Pico amarillento con el extremo de la mandíbula verdoso, tarsos verdosos, iris castaño.

Las plumas blanquecinas de la parte inferior del cuerpo, indican que el ave no es completamente adulta.

## ORDEN LARIFORMES.

(Gaviotas, gaviotines)

### 8. [*Larus maculipennis* (LICHTENSTEIN)].

*Larus maculipennis* LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. Berl. Mus., p. 83 (1823—*Monte Video*, in Mus. Berol.) descr. orig.

*Larus maculipennis* APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 211 (Uruguay).

Observada con frecuencia en la costa de la isla. No se han coleccionado ejemplares.]

(Continuará.)