

EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Notas sobre una colección de aves de la isla de Martín García (Parte 2a.)

Dabbene, R.
1918

Cita: Dabbene, R. (1918) Notas sobre una colección de aves de la isla de Martín García (Parte 2a.). *Hornero* 001 (02) : 089-096

www.digital.bl.fcen.uba.ar

Puesto en linea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

otros Totac, y por esto hay también quién le llame así. Los brasileños le llaman Masarico». Es el *Theristicus caudatus* (BODD.).

La «Bandurria de cuello jaspeado» que los guaraníes suelen llamar Carauy, porque le encuentran alguna semejanza con otra ave que llaman Carau, es el *Plegadis guarauna* (LIN.) y ha sido visto por AZARA «en el Paraguay y campos de Buenos Aires, siempre en bandadas de 20 a 60».

(Continuará).

NOTAS SOBRE UNA COLECCIÓN DE AVES

DE LA ISLA DE MARTÍN GARCÍA

POR

ROBERTO DABENE

(Continuación de la pág. 34)

ORDEN CHARADRIIFORMES⁽¹⁾.

(Chorlos, Becasinas, Teros, Ostreros, Batitúes, etc.)

Familia Charadriidae

9. *Belonopterus cayennensis grisescens* (PRÁZAK).

(TERO TEROS)

[*Parra cayennensis* GMELIN, Syst. Nat. ed. XIII, i, II, p. 706 (1789 — ex BUFF. et DAUBENT., Pl. Enl. 836 — typ. ex Cayenne)].

Vanellus grisescens PRÁZAK, Ornithol. Monatsber., IV Jahrg., N.º 2, Febr. 1896, p. 23 (1896 — N. Chile) descr. orig.

Vanellus cayennensis (nec *Parra cayennensis* GMELIN) BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 278 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — GIBSON, The Ibis, fifth ser., vol. III, N.º XI, July 1885, p. 282 (Paysandú, Uruguay). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 205 (Uruguay).

Belonopterus grisescens BRABOURNE and CHUBB, The Birds of South America, I, 1912, p. 38 [Argentina, Paraguay, Uruguay, ? N. Chile.]

Vanellus grisescens C. H. B. GRANT, The Ibis, ninth ser., vol. VI, N.º 22, April 1912, p. 474 (caracteres distintivos de las tres formas).

(1) Según el nuevo arreglo de este orden hecho recientemente por MATHEWS, la familia Charadriidae comprende las subfamilias Lobivanellinae y Charadriinae de SHARPE y la familia Scolopacidae, las subfamilias Totaninae y Scolopacinae de ese autor excepto *Rostratula*. Cf. MATHEWS, Birds Australia, III, i, 1913, p. 2 y III, 4, p. 307.

N.º 8965 g. ♂ ad. Isla Martín García, Enero 15, 1917. — ANTONIO POZZI.
Iris granate.

Esta forma parece intermediaria entre *Belonopterus cayennensis* (GM.) del Brasil y *B. chilensis* (MOL.) del oeste de la República Argentina, Patagonia y Chile. El ejemplar concuerda en todos sus detalles con una serie de la República Argentina, y con un ejemplar de Buena Vista, Bolivia, (colección STEINBACH) todas pertenecientes a la colección del Museo Nacional.

Familia Sco'opacidae

10. *Totanus flavipes* (GMELIN).

(CHORLO PATAS AMARILLAS)

[*Scolopax*] *flavipes* GMELIN, Syst. Nat. ed. XIII, i, 11, p. 659 (1789 — ex LATH. — «Habitat auctumno in Noveboraco») descr. orig.

Totanus flavipes BARROWS, The Auk, I, N.º 4, Oct. 1884, p. 315 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) (desde Nov. a Abril). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 209 (Uruguay) (en Octubre).

N.º 8965 h. ♂, Isla Martín García, Diciembre 20, 1916. — ANTONIO POZZI.
Iris castaño.

II. *Totanus melanoleucus* (GMELIN).

(CHORLO REAL)

Scolopax] *melanoleuca* GMELIN, Syst. Nat., ed. XIII, i, 11, p. 659 (1789, ex Lath. — «Habitat auctumno in arenis littoris Labrador», loc. tip. fijada Chateau Bay) descr. orig.

Totanus melanoleucus BARROWS, The Auk, I, N.º 4, Oct. 1884, p. 315 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) (todo el año, más numeroso de Agosto a Noviembre). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 209 (Uruguay) en Marzo.

N.º 8965 i. ♂, Isla Martín García, Diciembre 5, 1916. — ANTONIO POZZI.
Iris castaño.

12. [*Bartramia longicauda* (BECHSTEIN).

(BATITÚ)

Tringa longicauda BECHSTEIN in LATHAM, Allg. Ueb. Vögel, IV, ii, p. 453 (1812 — Norte America) descr. orig.

Actiturus bartramius BARROWS, The Auk, I, N.º 4, Oct. 1884, p. 315 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) (de Noviembre a Abril). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 209 (Uruguay).

Observada en la isla, pero no coleccionada por el señor Pozzi].

13. Gallinago⁽¹⁾ braziliensis braziliensis (SWAINSON).

(BECASINA, CANASTITA)

Scolopax Braziliensis SWAINSON, Faun. Bor. — Amer., Birds, p. 400 note (1831 — *Equinoctial Brazil*) descr. orig.

Gallinago frenata auct. (nec *Scolopax frenata* LICHTENSTEIN) Cf. BERLEPSCH, Novit. Zool., XV, 1908, p. 308.

Becasina 2.^a AZARA, Apunt., etc. III, 1805, p. 275, N.^o CCCLXXXVIII.

N.^o 8965 ♂ ad. Isla Martín García, Diciembre 3, 1916. — ANTONIO POZZI.

Esta especie se distingue de *Gallinago paraguaiae* (VIEILLOT) solamente por tener las secundarias externas más largas que las cobijas primarias.

Familia Jacanidae.

Cf. MATHEWS, Birds Australia III, pt. 4, 1913, p. 312.

14. Jacana jacana (LINNAEUS).

(GALLITO)

[*Parra*] *Jacana LINNÆUS*, Syst. Nat. ed. XII, I, pt. 2, p. 259 (1766 — ex MARCGRAVE y EDWARDS — hab. «America australis — hab. subst. Surinam, ex EDWARDS) descr. orig.

Parra jacana LEE, The Ibis, third ser. III, N.^o X, April 1873, p. 137 (Río Gato, cerca Gualeguaychú, Entre Ríos). — BARROWS, The Auk, I, N.^o 3, July 1884, p. 277 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.^o XXII, April 1894, p. 205 (Río Negro, Uruguay).

N.^o 8965 ♂ ad. Isla Martín García, Diciembre 6, 1916. — ANTONIO POZZI.

ORDEN GRUIFORMES.

Subord. Aramif.

Familia Aramidae.

15. [Aramus scolopaceus scolopaceus (GMELIN).

(CARÁU, CARAO, VIUDA LOCA)

[*Ardea*] *scolopacea* GMELIN, Syst. Nat., ed. XIII, i, 11, p. 647; (1789 — ex DAUBENTON, Pl. Enl. 848 — *Cayenne*) descr. orig.

(1) MATHEWS (Birds Australia, III, 3 1813, p. 294) ha separado este género en varios subgéneros y ha colocado la presente especie en el subgénero *Odurella* MATHEWS, l. c., tipo *Scolopax braziliensis* SWAINSON.

Aramus scolopaceus BARROWS, The Auk, I, N.^o 3, July 1884, p. 277 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

Esta especie ha sido observada con frecuencia en la isla. No se han traído ejemplares.

Según me lo ha comunicado el señor ERNESTO GIBSON, esta especie se alimenta especialmente del molusco *Ampullaria canaliculata* LAM.]

ORDEN ARDEIFORMES.

Subord. Ardeae.

Familia Ardeidae.

16. [Ardea cocoi LINNAEUS.

(GARZA MORA)

[*Ardea*] *Cocoi* LINNAEUS, Syst. Nat., ed. XII, i, p. 237 (1766 — ex BRISON, etc. — ex «Cayenne») descr. orig.

Ardea cocoi BARROWS, The Auk, I, N.^o 3, July 1884, p. 271 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.^o XXII, April 1894, p. 197 (Uruguay).

Observada varias veces en la isla.]

17. Nycticorax nycticorax naevius (BODDAERT).

(BRUJA, PÁJARO YAGUÁ)

[*Ardea Nycticorax* LINNAEUS, Syst. Nat., ed. X, i, p. 142, (1758 — hab. in Europa austral — hab. substit. Hungaria ex MARSIGLI)].

Ardea naevia BODDAERT, Tabl., Pl. Enl., p. 53 (1783. — ex DAUBENT., Pl. Enl. 939, typ. ex Cayenne — av. juv.) descr. orig.

Nycticorax gardeni BARROWS, The Auk, I, N.^o 3, July 1884, p. 271 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

Nycticorax obscurus (nec LICHTENSTEIN) APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.^o XXII, April 1894, p. 199 (Uruguay).

Nycticorax tayazu-guira SHARPE, Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 155 (1898). Cf. HARTERT, Bull. B. O. C., XXXV, N.^o CC, Nov. 4, 1914, p. 15.

N.^o 8965 l. ♀ jov. Isla Martín García, Diciembre 6, 1916. — ANTONIO POZZI. Iris oscuro.

18. Ixobrychus (1) involucris (VIEILLOT).

(GARCITA)

Ardea involucris VIEILLOT, Enc. Méth., iii, p. 1127 (1823 — fundada sobre

(1) *Ixobrychus* BILLBERG, Synt. Faunae Scand., I, ii, Aves, 1828, p. 166. Tipo por subsiguiente designación: *Ardea minuta* LINNAEUS. Cf. STONE, Auk, April 1907, p. 192 y BRABOURNE and CHURB, The Birds of South Amer., I. 1912, p. 52. Reemplaza *Ardeetta* GRAY 1842 con el mismo tipo.

«Garza varia» AZARA, Apunt., etc., III 1805, p. 185, N.º CCCLXI.—
Paraguay) descr. orig.

Ardetta involucris BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 271 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 199 (Montevideo).

N.º 8965 m. ♂ no enteramente adulto. Isla Martín García, Diciembre 21, 1916. — ANTONIO POZZI. Iris castaño; tarsos verdosos.

ORDEN PALAMEDEIFORMES.

(Chajáes)

19. [*Chauna Salvadorii* (BRABOURNE y CHUBB).]

(CHAJÁ)

Chauna salvadorii BRABOURNE and CHUBB, The Birds of South Amer., I, p. 53 (1912 — Argentina) nom. nov. pro *Palamedea cristata* SWAINSON, nec LINNAEUS.

Chauna chavaria (nec *Parra chavaria* LINNAEUS) BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 272 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 200 (Paso de Navarro, Río Negro, Uruguay).

Señalada en la isla en varias ocasiones.]

ORDEN ANSERIFORMES.

(Patos, cisnes, etc.)

Familia Anatidae.

20. [*Cygnus melanocoryphus* (MOLINA).]

(CISNE DE CUELLO NEGRO)

Anas melanocorypha MOLINA, Saggio Stor. Nat. Chili, p. 234 (1782 — Chile) descr. orig.

Cygnus nigricollis BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 273 (? Concepción). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 200 (estancia Santa Adelaida y estancia Maquelette, Uruguay).

Observada en la isla en distintas ocasiones.]

21. [*Dafila spinicauda* (VIEILLOT).]

(PATO BARCINO, PATO MAIZERO)

Anas spinicauda VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., V, p. 135 (1816 — fundada sobre «Pato cola aguda» AZARA, Apunt., etc., III, 1805, p. 421, N.º CCCCXXIX. — Buenos Aires) descr. orig.

Dafila spinicauda BARROWS, The Auk, I, N.^o 3, July 1884, p. 274 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.^o XXII, April 1894, p. 201 (Uruguay).

Observada en la isla por el señor ANTONIO POZZI.]

22. *Querquedula versicolor* (VIEILLOT).

(PATO ARGENTINO)

Anas versicolor VIEILLOT, Nouv. Dict. d' Hist. Nat., V, p. 109 (1816 — fundada sobre « Pato pico de tres colores » AZARA, Apun., III, 1805, p. 450, N.^o CCCCXL — Paraguay) descr. orig.

Querquedula versicolor BARROWS, The Auk, I, N.^o 3, July 1884, p. 274 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.^o XXII, April 1894, p. 200 (Uruguay).

N.^o 8965 n. ♀ ad. Isla Martín García, Enero 19, 1917. — ANTONIO POZZI.

ORDEN PELECANIFORMES.

(Cormoranes y Biguáes)

Familia Phalacrocoracidae.

23. [*Phalacrocorax vigua vigua* (VIEILLOT).

(BIGUÁ)

Hydrocorax vigua VIEILLOT, Nouv. Dict. d' Hist. Nat., VIII, p. 90 (1817 — fundada sobre « Zaramagallon negro » AZARA, Apunt., III, 1805, p. 395, N.^o CCCXXIII — Paraguay) descr. orig.

Phalacrocorax brasiliensis BARROWS, The Auk, I, N.^o 3, July 1884, p. 270 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.^o XXII, April 1894, p. 197 (Montevideo, Flores, Soriano y Río Negro, Uruguay).

Observada con frecuencia en la isla.

Aprovecho la ocasión para hacer notar, que según el señor JUAN MOGENSEN, los especímenes de esta especie de biguá, del noroeste de la República Argentina, son distintos de los de la costa de Patagonia, y probablemente pertenecen a una forma diferente de la que habita la costa del mar.]

ORDEN ACCIPITRIFORMES.

Familia Falconidae.

Subfam. Polyborinae.

24. [*Polyborus plancus* (MILLER).

(CARANCHO)

Falco plancus MILLER, Var. Subj. Nat. Hist., pl. 17 (1778 — Tierra del

Fuego) [= *Polyborus tharos* (MOLINA 1782) y auctorum] Cf. BRA-
BOURNE y CHUBB, Birds South Amer., I, 1912, p. 62.

Polyborus tharos BARROWS, The Auk, I, N.º 2, April 1884, p. 111 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — GIBSON, The Ibis, fifth ser., vol. III, N.º XI, July 1885, p. 282 (Paysandú, Uruguay). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 186 (Arroyo Grande, Uruguay).

Común en la isla. No se han traído ejemplares.]

25. [**Milvago chimango** (VIEILLOT)].

(CHIMANGO)

Polyborus chimango VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., V, p. 260 (1816 — fundada sobre «Chimango» AZARA, Apunt., etc., I, 1802, p. 47, N.º V — Paraguay) descr. orig.

Milvago chimango GOULD in DARWIN, The Zool. of the Voyage «Beagle», III, Birds, 1841, p. 14 (Maldonado, Uruguay). — BARROWS, The Auk, I, N.º 2, April 1884, p. 111 (Concepcion del Uruguay, Entre Ríos). — GIBSON, The Ibis, fifth ser., vol. III, N.º XI, July 1885, p. 282 (Paysandú, Uruguay). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 196 (Santa Elena, Río Negro, y Santa Florencia, Uruguay).

Observada con frecuencia en la isla. No se han traído ejemplares.]

Subfamilia **Falconinae**.

26. [**Cerchneis sparverius australis** (RIDGWAY)].

(HALCONCITO DE DORSO ROJIZO)

[*Falco sparverius* LINNAEUS, Syst. Nat., ed. X, I, p. 90 (1758 — ex CATESBY — Virginia, Carolina).]

Falco sparverius australis RIDGWAY in BAIRD, BREWER and RIDGWAY, Hist. North Amer. Birds, III, p. 166 (1874 — Paraná, Capt. PAGE — loc. tip. subst. Bahia⁽¹⁾ auct. CHAPMAN 1915).

Falco gracilis (nec LESSON) SWAINSON, Anim. in Ménag., 1838, p. 281 (Bahía, Brasil).

Tinnunculus sparverius (nec *Falco sparverius* LINNAEUS) LEE, The Ibis, third ser., vol. III, N.º X, April 1873, p. 135 (Gualeguaychú).

Falco sparverius (nec LINNAEUS) BARROWS, The Auk, I, N.º 2, April 1884, p. 110 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

⁽¹⁾ El nombre «australis» habiendo sido propuesto por RIDGWAY como un substituto de «gracilis» SWAINSON, ya empleado; Bahía debe ser la localidad típica de la subespecie. Cf. CHAPMAN, Bull. Amer. Mus., N. H. XXXIV, Art. XI, Mayo 27, 1915, p. 380.

Tinnunculus cinnamominus (nec *Falco cinnamominus* SWAINSON) APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.^o XXII, April 1894, p. 195 (Río Negro, Santa Elena, y Las Coronas, Uruguay).

Cerchneis sparverius australis CHAPMAN, Bull Amer. Mus. N. H. XXXIV, Art. XI, Mayo 27, 1915, p. 380. [Desde la pendiente este de los Andes en Perú, Bolivia y Argentina al Atlántico; al norte al Amazonas].

De esta forma de halconcito, el señor ANTONIO Pozzi trajo un ejemplar vivo.

Familia Buteonidae.

27. Rostrhamus sociabilis (VIEILLOT).

(CARACOLERO)

Herpetotheres sociabilis VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XVIII, p. 318 (1817 — fundada sobre «Gavilán del estero sociable» AZARA, Apunt., etc., I, 1802, p. 84, N.^o XVI. Av. juv. — Sud América, Lat. 27° — 30° S. in distrito de Corrientes y en el Río de la Plata) descr. orig.

Cymindes leucopygus SPIX, Av Bras, I, 1824, p. 7 tab. II («ad. flumen Amazonum»). Cf. HELLMAYR, Abhandl. K. Bayer. Akad. Wiss., II, Kl., Bd. XXII, 3.^a Abt. 1905, p. 568, 569.

Rostrhamus sociabilis LEE, The Ibis, third ser., vol. III, N.^o X, April 1873, p. 135 (Gualeguaychú, Entre Ríos).

Rostrhamus sociabilis APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.^o XXII, April 1894, p. 195 (Montevideo).

Rostrhamus leucopygus BARROWS, The Auk, I, N.^o 2, April 1884, p. 111 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

N.^o 8965 o. ♀ jov. Isla Martín García, Diciembre 5, 1916. — ANTONIO POZZI. — Iris castaño.

N.^o 8965 p. ♂ ad. Isla Martín García, Diciembre 5, 1916. — ANTONIO POZZI. — Iris granate.

(Continuará).

N O T A S

SOBRE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ALGUNAS ESPECIES DE AVES

Dos aves nuevas para la Argentina. — El señor JUAN MOGENSEN me ha enviado para la determinación dos pieles de aves que trajo de su último viaje a Misiones. Pertencen a dos especies nuevas para nuestra avifauna y son las siguientes: