

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Notas sobre una colección de aves de la isla de Martín García (Parte 4a)

Dabbene, R.  
1919

Cita: Dabbene, R. (1919) Notas sobre una colección de aves de la isla de Martín García (Parte 4a). *Hornero* 001 (04) : 236-248

[www.digital.bl.fcen.uba.ar](http://www.digital.bl.fcen.uba.ar)

Puesto en linea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Buenos Aires

NOTAS SOBRE UNA COLECCIÓN DE AVES  
DE LA ISLA DE MARTÍN GARCÍA

POR  
ROBERTO DABBENE

(Continuación de la pág. 168)

Familia Tyrannidae

(Bienteveos, tijeretas, churrinches, picos de plata, piojitos, etc.)

**45. [Taenioptera irupero (VIEILLOT).**

(VIUDA)

*Tyrannus irupero* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XXXV, p. 92 (1819 — fundada sobre «Pepoázá Iruperó» AZARA, Apunt., II, 1805, p. 171, N.<sup>o</sup> CCIV — Paraguay) descr. orig.

*Taenioptera irupero* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 139 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.<sup>o</sup> XXII, April 1894, p. 176 (Santa Elena, Uruguay; criando en un nido de Hornero, en Octubre).

Observada en la isla].

**46. Sisopygis icterophrys (VIEILLOT).**

*Muscicapa icterophrys* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XII, p. 458 (1817 — fundada sobre «Suirirí obscuro y amarillo» AZARA, Apunt., II, 1805, p. 118, N.<sup>o</sup> CLXXXIII — Paraguay) descr. orig.

*Sisopygis icterophrys* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 141 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.<sup>o</sup> XXII, April 1894, p. 177 (Santa Elena y Sauce, Uruguay — en Nov. y Marzo).

N.<sup>o</sup> 8965 h. ♂ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. — ANTONIO POZZI.

Esta especie está representada en Bolivia por la forma *S. Hellmayri* CHUBB.

**47. [Lichenops perspicillata perspicillata (GMELIN).**

(PICO DE PLATA)

*Motacilla perspicillata* GMELIN, Syst. Nat., I, p. 969 (1789 — «Habitat ad fluvium Plata Americae») descr. orig.

*Lichenops perspicillatus* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 141 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 177 (Sur Rep. Uruguay — hasta Mayo).

Señalada en la isla].

**48. Serpophaga subcristata (VIEILLOT).**

(PIOJITO)

*Sylvia subcristata* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XI, p. 229 (1817 — fundada sobre «Contramaestre copetillo ordinario» AZARA, Apunt., II, 1805, p. 66, N.º CLX — Paraguay) desc. orig.

*Serpophaga subcristata* BARR. WS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 199 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 178 (Sur de la Rep. Uruguay — en Nov.).

N.º 8965 ♂. ♀ ad. Isla de Martín García, Dic. 5, 1916. — ANTONIO POZZI.

**49. Elaenia parvirostris PELZELN**

*Elainea parvirostris* PELZELN, Zur Ornith. Bras., II, pp. 107, 178 (1868 — Curytiba, Prov. Paraná, Brasil).

*Elainea modesta* (nec TSCHUDI) BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 200 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

*Elainea albiceps* (nec aut.) APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. IV, N.º XXII, April 1894, p. 179 (Sta. Elena, Uruguay — de Nov. a Mayo). Cf. BERLEPSCH, Proc. fourth Intern. Ornith. Congress London 1905 (vol. XIV, Ornis) p. 413 (1907).

N.º 8965 ♂. ♀ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. — ANTONIO POZZI.

N.º 8965 ♂. ♀ ad. Isla Martín García, Dic. 8, 1916. — ANTONIO POZZI.

**50. Sublegatus fasciatus fasciatus (THUNBERG).**

*Pipra fasciata* THUNBERG, Mém. Acad. Imp. Sci. St. Petersb., VIII, pp. 283, 285 (1822 — Brasil) descr. orig. Cf. LÖNNBERG, The Ibis, 1903, p. 241.

*Muscipeta brevirostris* LAFRESNAYE et D'ORBIGNY, Syn. Av., I, in Mag. Zool. 1837, Cl. II, p. 49.

*Empidagra brevirostris* + *Sublegatus platyrhynchos* + *S. griseocularis* SCLATER, Cat. Birds Brit. Mus., XIV, pp. 155, 157, 158 (1888). Cf. BERL. u. HELLM., Journ. f. Ornith. 1905, pp. 4-5.

N.º 8965 ♂. ♀ ad. Isla Martín García, Enero 10, 1917 — ANTONIO POZZI.

N.<sup>o</sup> 8965 m'. ♂ ad. Isla Martín García, Enero 12, 1917. — ANTONIO POZZI.

Esta especie, la cual ha sido señalada en Corrientes (D'ORBIGNY); Tucumán (LILLO); Ocampo, Chaco (VENTURI) parece extenderse mucho más al Sur durante el verano.

### 51. **Pitangus sulphuratus bolivianus** (LAFRESNAYE).

(BIENTEVEO)

*Saurophagus bolivianus* LAFRESNAYE, Rev. Zool., 1852, p. 463 (1852 — Chuquisaca, Bolivia) descr. orig.

*Pitangus bellicosus* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 200 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

*Pitangus bolivianus* APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.<sup>o</sup> XXII, April 1894, p. 179 (Sur Rep. Uruguay — residente).

N.<sup>o</sup> 8965 n'. ♂ ad. Isla Martín García, Dic. 5, 1916. — ANTONIO POZZI.

Este ejemplar está en cambio de plumaje.

### 52. **Myiodynastes solitarius** (VIEILLOT).

*Tyrannus solitarius* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XXXV, p. 88, (1819 — fundada sobre «Chorreado todo» AZARA, Apunt., II, 1805, p. 145, N.<sup>o</sup> CXCVI — Paraguay) descr. orig.

*Myiodynastes solitarius* BARROWS, Bull. Nutt., Orn. Club, VIII, 1883, p. 201 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

N.<sup>o</sup> 8965 o'. ♂ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. — ANTONIO POZZI.

N.<sup>o</sup> 8965 p'. ♀ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. — ANTONIO POZZI.

### 53. **Pyrocephalus rubinus rubinus** (BODDAERT).

(CHURRINCHE)

*Muscicapa rubinus* BODDAERT, Tabl. Pl. Enl., p. 42 (1783 — Brasil) descr. orig.

*Pyrocephalus rubineus* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883 p. 201, (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.<sup>o</sup> XXII, April 1894, p. 180 (Montevideo — en Octubre; Santa Elena, Rep. Uruguay — Oct. hasta Mayo).

N.<sup>o</sup> 8965 q'. ♀ ad. Isla de Martín García, Dic. 6 de 1916. — ANTONIO POZZI.

**54. *Tyrannus melancholicus melancholicus* VIEILLOT.**

(SURIRI, CIRIRI)

*Tyrannus melancholicus* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XXXV, p. 48 (1819 — fundada sobre «Suirirí-guazú» AZARA, Apunt., II, 1805, p. 152, N.º CXCVIII — Paraguay) descr. orig.

*Tyrannus melancholicus* LEE, The Ibis, third ser., vol. III, N.º X, April 1873, p. 133 (Gualeguaychú, Entre Ríos). — BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 202 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 180 (Santa Elena, Uruguay — en Nov.; Sauce, Uruguay — en Enero).

N.º 8965 r'. ♂ ad. Isla Martín García, Dic. 6, 1916. — ANTONIO POZZI.

**55. *Muscivora tyrannus* (LINNEO).**

(TIJERETA)

*Muscicapa tyrannus* LINNAEUS, Syst. Nat. ed. XII, I, p. 825 (1766 — *Ca-yenne*) descr. orig.

*Milvulus tyrannus* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 203 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol VI, N.º XXII, April 1894, p. 180 (Santa Elena, Uruguay — Oct. a Enero).

N.º 8965 s'. ♂ ad. Isla Martín García, Dic. 5, 1916. — ANTONIO POZZI..

Familia Cotingidae

**56. *Pachyramphus polychropterus notius* BREWSTER et BANGS**

[*Platyrhynchus polychropterus* (<sup>1</sup>) VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XXVII, p. 10 (1819 — «Nouvelle Holland» errore! = S. E. Brasil, auct HELLMAYR)].

(<sup>1</sup>) La especie típica es aparentemente el «Batará oscuro y negro» de AZARA, Apunt. II, 1805, p. 210, N.º CCXVII, y corresponde a la descripción de *Clinacocercus cyanocephalus* BERTONI, Aves nuevas del Paraguay, p. 112, 1901.

*Pachyramphus notius* BREWSTER et BANGS. Proc. New Engl. Zool. Club, II, p. 53 (1901 — Concepción del Uruguay — BARROWS) descr. orig.

*Pachyramphus polychropterus* (nec VIEILLOT) APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April, 1894, p. 181 (Río Negro, Uruguay en Dic.).

N.º 8965 t'. ♂ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916 — ANTONIO POZZI.

Este ejemplar es idéntico a otros machos adultos colectados en Montevideo por el Sr. J. TREMOLERAS (Dic. 28, 1917) y en Los Talas, cerca de La Plata, a mediados de Marzo 1907 por el Sr. ANTONIO POZZI. Los tres ejemplares tienen las par-

tes inferiores plomizas desde la garganta hasta la cola, y en esto se diferencian de otro ejemplar perteneciente a la forma típica procedente de Mocoví (Chaco Austral) colectado en Enero de 1904 por el Sr. F. M. RODRÍGUEZ, en el cual dichas partes son de un negruzco grisáceo, más claro, sobre el abdomen. Del mismo modo un ejemplar hembra coleccionado en la Ensenada (La Plata 17 Nov. 1918) por el Sr. A. POZZI se distingue de otra hembra colectada en Octubre en Mocoví, Chaco Austral, por tener las partes inferiores desde la barba hasta la cola de un color amarillento de azufre mezclado con grisáceo sobre el pecho; mientras esas partes son gris blanquiscas débilmente teñidas con amarillento en el otro ejemplar.

Me ha sido imposible leer la descripción original de BREWSTER y BANGS del ejemplar de Concepción (Uruguay), y descripto con el nombre de *P. notius*, pero no dudo que el ejemplar de Martín García y los del noreste de la Provincia de Buenos Aires pertenezcan a esa forma.

La forma típica parece habitar más al norte: Chaco, Paraguay y Brasil.

Familia Hirundinidae  
(Golondrinas)

**57. *Progne chalybea domestica* (VIEILLOT).**

(GOLONDRINA)

[*Hirundo chalybea* GMELIN, Syst. Nat., I, p. 1026 (1789 — Cayenne)].  
*Hirundo domestica* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XIV, p. 520 (1817 — fundada sobre «golondrina doméstica» AZARA, Apunt., II, 1805, p. 502, N.º CCC — Paraguay y Río de la Plata) descr. orig.  
*Progne chalybea* (nec GMELIN) LEE, The Ibis, third ser., vol. III, N.º X, April 1873, p. 133 (Gualeguaychú, Entre Ríos). — BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 88 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

N.º 8965 u'. ♂ ad. Isla Martin García, Dic. 6, 1916. — ANTONIO POZZI.

Familia Sylviidae  
(Piojitos azulados)

**58. *Polioptila dumicola* (VIEILLOT).**

(PIOJITO AZULADO)

*Sylvia dumicola* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XI, p. 170 (1817 — «Guyane» — Hab. substit. Uruguay (1)).

(1) Es dudoso que la descripción de AZARA pueda referirse a esta especie o a *P. Berlepschi* HELLM.

*Polioptila dumicola* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 86  
 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 163 (Uruguay, en Feb. y Marzo).  
 N.º 8965 v'. ♂ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. — ANTONIO POZZI.  
 N.º 8965 w'. ♀ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. — ANTONIO POZZI.

Estos ejemplares tienen la garganta y pecho blanco ceniciento, mientras otro de Quilmes, Buenos Aires, la garganta y una gran porción de las partes inferiores son azul ceniciente. Sin duda se debe a que este último ejemplar está en plumaje de invierno, pues ha sido cazado en Julio.

Familia Troglodytidae  
 (Ratonas)

[59. **Troglodytes musculus guarixa** PUCHERAN.  
 (RATONA, TACUARITA)]

[*Troglodytes musculus* NAUMANN, Vögel Deutschl., iii, p. 724, table (1823. Bahía)].  
*Troglodytes guarixa* PUCHERAN (ex CUVIER MS.), Arch. Mus. París vii, p. 338 (1855 — «Brésil», colecc. Delalande y St. Hilaire).  
*Troglodytes platensis* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 86 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).  
*Troglodytes furvus* APLIN, The Ibis, sixth ser., vol VI, N.º XXII, April 1894, p. 168 (Uruguay — residente).

Observado en distintas ocasiones en la isla].

Familia Mimidae  
 (Calandrias)

[60. **Mimus modulator modulator** (GOULD).  
 (CALANDRIA)]

*Orpheus modulator* GOULD, Proc. Zool. Soc. Lond., IV, 1836, p. 6 (April 1836 — «in fret. Magellan» errore! hab. substit. «boca del río de La Plata»).  
*Mimus calandria* (nec *Orpheus calandria* LAFR. et D'Orb.) BARROWS, Bull. Nutt. Ornith. Club, VIII, 1883, p. 85 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).  
*Mimus modulator* APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 162 (Uruguay — residente).

Observada en la isla.

La forma típica es la que habita la parte Este de la Ar-

gentina: Entre Ríos, Buenos Aires; Uruguay y la provincia de Río Grande del Sur en el Brasil. En el Paraguay, S. E. Bolivia, Centro y Norte de la Argentina, está reemplazada por la forma *M. m. calandria* (ORB. et LAFR.). Cf. HELLMAYR, Novit. Zool. XXI, 1914, p. 159].

**Familia Turdidae**

(*Zorzales*)

**61. *Planesticus amaurochalinus* (CABANIS).**

(*ZORZAL BLANCO*)

*Turdus amaurochalinus* CABANIS, Mus. Hein., I, p. 5 (1850 — Brasil) descr. orig.

*Turdus leucomelas* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 85 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 161 (Santa Elena, Uruguay, en Oct., nido en Febr.).

N.º 8965, ♂. ad. Isla Martín García, Dic. 20, 1913. — ANTONIO POZZI.

N.º 8965 ♀. ad. Isla Martín García, Enero 2, 1917. — ANTONIO POZZI.

En este último ejemplar el pico es muy amarillento mientras en el primero es color de cuerno.

**62. *Planesticus rufiventris* (VIEILLOT).**

(*ZORZAL COLORADO*)

*Turdus rufiventris* VIEILLOT, Nouv. Dict. d Hist. Nat., XX, p. 226 (1818 — Brasil = Río). descr. orig.

*Turdus rufiventris* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 85 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 161 (Río Negro y Arroyo Grande, Rep. Uruguay, en Dic.).

N.º 8965 z'. ♂ jov. Isla Martín García, Enero 1, 1917. — ANTONIO POZZI.

N.º 8965 a''. ♂ ad. Isla Martín García, Enero 14, 1917. — ANTONIO POZZI.

N.º 9246. ♂ casi adulto.

Este último ejemplar ha sido traído vivo y murió en cautividad cerca de un año después de su captura. Durante este tiempo la coloración general del plumaje se ha puesto de un pardo oscuro casi uniforme, algo más clara en las partes inferiores. En el vientre se notan sólo algunas pequeñas áreas rojizas, lo mismo que en las tapadas internas del ala.

Familia Vireonidae

**63. Vireosylva chivi chivi (VIEILLOT)**

*Sylvia chivi* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat. XI, p. 174 (1817 — fundada sobre «Contramaestre gaviero» AZARA, Apunt. II, 1805, p. 34, N.<sup>o</sup> CLII — Paraguay) descr. orig.

N.<sup>o</sup> 8965 b'. ♂ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. — ANTONIO POZZI.

**64. Cyclarhis ochrocephala ochrocephala TSCHUDI.**

(JUAN CHIVIRO, BUEN CANTOR)

*Cyclarhis ochrocephala* TSCHUDI, Arc. fir Naturg. p. 362 (1845 — Sur del Brasil) descr. orig.

*Cyclarhis viridis* VIEILLOT (nec BARROWS), Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 88 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) Cf ALLEM, The Auk, 1889, p. 269.

*Cyclarhis ochrocephala* APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.<sup>o</sup> XXII, April 1894, p. 165 (Uruguay, Arroyo Grande y Río Negro — en Mayo).

N.<sup>o</sup> 8965 c'. ♂ ad. Isla Martín García, Enero 12, 1917. — A. Pozzi.

Familia Mniotiltidae

**65. Compsothlypis pitiayumi pitiayumi (VIEILLOT).**

*Sylvia pitiayumi* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XI, N.<sup>o</sup> 276 (1817 — fundada sobre «Pico de punzón celeste pecho de oro» AZARA, Apunt. I, 1802, p. 421, N.<sup>o</sup> CIX. — Paraguay) descr. orig.

*Parula pitiayumi* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 87, (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.<sup>o</sup> XXII, April 1894, p. 165 (Río Negro, Uruguay).

N.<sup>o</sup> 8965 d'. ♂ ad. Isla Martín García, Dic. 26, 1916. — ANTONIO POZZI.

N.<sup>o</sup> 8965 e'. ♀ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. — ANTONIO POZZI.

Familia Tanagridae

**[66. Thraupis<sup>(1)</sup> sayaca sayaca (LINNEO).**

[*Tanagra*] *sayaca* LINNAEUS, Syst. Nat. I, p. 316, (1766 — «Brasilia») descr. orig.

*Tanagra cyanoptera* (nec VIEILLOT) BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 91 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

Observada en la isla.]

<sup>(1)</sup> Reemplaza *Tanagra* Lin. Cf. ALLEN, Bul'. Amer. Mus. N. H., XXVIII, 1910, p. 335.

**67. *Thraupis bonariensis* (GMELIN).**

(SIETE COLORES, SIETE CUCHILLAS, SANTA LUCIA)

[*Loxia*] *bonariensis* GMELIN, Syst. Nat., I, p. 850 (1789 — *Buenos Aires*)  
descr. orig.

*Tanagra striata* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 91. (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

*Tanagra bonariensis* APLIN, The Ibis, sixth. ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 168 (Rep. Uruguay — residente).

N.º 8965 f'. ♂ jov. Isla Martín García, Enero 11, 1917. — ANTONIO POZZI.  
N.º 8965 g'. ♀ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. — ANTONIO POZZI.

## Familia Fringillidae

(Mixtos, Cardinales, Jilgueros, Chingolos, etc.)

**68. *Cyanoloxia glaucoaerulea* (D'ORBIGNY et LAFRESNAYE).**

*Pyrrhula glauco-caerulea* D'ORBIGNY et LAFRESNAYE, Syn. Av. I, in Mag. Zool., Cl. II, p. 85 (1837 — *Maldonado*, Rep. Oriental) descr. orig.

*Guiraca glaucoaerula* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 92 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 168 (Uruguay).

N.º 8965 h'. ♂ ad. Isla Martín García, Enero 21, 1917. — ANTONIO POZZI.

N.º 8965 i'. ♀ ad. Isla Martín García, Dic. XII, 1916. — ANTONIO POZZI.

**69. *Sporophila caerulescens caerulescens* (VIEILLOT).**

(CORBATITA)

*Pyrrhula caerulescens* VIEILLOT, Enc. Méth., iii, p. 1023 (1823 — «Brésil»)  
descr. orig.

*Spermophilus caerulescens* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 92 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 168 (Uruguay — en Nov.).

N.º 8965 j'. ♂ ad. Isla Martín García, Dic. 20, 1916. — ANTONIO POZZI.

N.º 8965 k'. ♀ ad. Isla Martín García, Enero 12, 1917. — ANTONIO POZZI.

La hembra tiene las partes inferiores blanquizcas con un ligero baño amarillento.

**[70. *Sicalis arvensis arvensis* (KITTLITZ)].**

(MIXTO)

*Fringilla arvensis* KITTLITZ, Mém. Acad. Imp. Sci. St. Pétersb., Sav. étrang., ii, p. 470 (1835 — *Chili*) descr. orig.

*Syecalis luteola* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 132 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 171 (Uruguay — residente).

Observado en la isla].

### 71. *Sicalis Pelzelni* SCLATER.

*Sicalis pelzelni* SCLATER, The Ibis, third ser., vol. II, N.º V, Jan. 1872, p. 42 (1872 — Buenos Aires) descr. orig.

*Sicalis pelzelni* APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April, 1894, p. 171 (Uruguay — residente).

N.º 8965  $\text{m}''$ . ♂ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. — ANTONIO POZZI.

### 72. *Passer domesticus domesticus* (LINNEO).

(GORRIÓN)

*Fringilla domestica* LINNAEUS, Syst. Nat., I, p. 323 (1766).

N.º 8965  $\text{m}''$ . ♂ ad. Isla Martín García, Enero 11, 1917. — A. POZZI.

### 73. *Brachyspiza capensis capensis* (P. L. S. MÜLLER).

(CHINGOLO)

*Fringilla capensis* P. L. S. MÜLLER, Syst. Nat., Suppl., p. 165 (1776 — Guiana).

*Zonotrichia pileata* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 131 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 169 (Uruguay — descr. nido).

N.º 8965  $\text{n}''$ . ♂ ad. Isla Martín García, Enero 5, 1917. — ANTONIO POZZI.

### 74. *Poospiza nigrorufa* (LAFRESNAYE et D'ORBIGNY).

(SIETE VESTIDOS)

*Emberiza nigro-rufa* LAFRESNAYE et D'ORBIGNY, Syn. Av., I, in Mag. Zool., VII, Cl. II, p. 81 (1837. — Hab. Santa Fe, Rep. Arg.) descr. orig.

*Poospiza nigrorufa* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 129 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 169 (Uruguay — en Mayo).

N.º 8965  $\text{o}''$ . ♂ ad. Isla Martín García, Enero 12, 1917. — ANTONIO POZZI.

### 75. *Embernagra platensis poliocephala* (GRAY).

(VERDÓN)

*Emberizoides poliocephalus* GRAY, Voy. «Beagle», III, Birds, p. 98 (1841 — Monte Video and Maldonado) descr. orig.

*Embernagra platensis* (nec GMELIN)? BARROWS, Bull. Nutt. Ornith. Club, VIII, 1883, p. 132 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN,

The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 170 (Uruguay: Santa Elena, Soriano — en Marzo).

*Embernagra platensis* SHARPE, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 758 (1888) part. especímenes c. d.

*Embernagra platensis poliocephala* CHUBB, The Ibis, Jan. 1918, p. 4.

N.º 8965 ♀. Ad. en cambio de plumaje, Isla Martín García, Dic. 6, 1916. — ANTONIO POZZI.

Este ejemplar concuerda con los caracteres que CHUBB indica para los especímenes del Uruguay, por tener la garganta de un gris más oscuro, el medio del abdomen blanquizo y por las estrías del dorso muy poco pronunciadas.

El espécimen de Martín García se diferencia a primera vista por estos caracteres de una serie de otros ejemplares de la Provincia de Buenos Aires con los cuales lo he comparado. Además, he observado que el ejemplar de Martín García carece de la coloración general ante en el pecho inferior, abdomen y flancos; estos últimos siendo grisáceos y ligeramente teñidos de ante.

Por ser el plumaje muy gastado, las dimensiones no corresponden a las indicadas por CHUBB y tal vez por este mismo motivo las secundarias internas carecen del ancho borde antepardusco que encierra el negro del restante de la pluma.

Ala 88 mm., cola (gastada) 84 mm., culmen expuesto, 15 mm., tarso 31 mm., dedo medio con uña, 27 mm., dedo posterior con uña 21 mm.

Varios ejemplares de Mendoza en la colección del Museo Nacional de Buenos Aires corresponden a los caracteres indicados para *Embernagra Gossei* CHUBB<sup>(1)</sup>, pero ésta debe ser considerada sólo como una subespecie de *Embernagra olivascens* D'ORBIGNY.

## 76. *Paroaria cristata* (<sup>(2)</sup>) (BODDAERT).

(CARDENAL)

*Fringilla dominicana cristata* BODDAERT, Tabl. Planches Enlum., p. 7, pl. 103 (1783 — Brasil).

<sup>(1)</sup> The Ibis, Jan. 1918, p. 9, Plate 1, fig. 2.

<sup>(2)</sup> Este nombre es el que debe ser usado en vez de *Loxia cucullata* LATHAM 1790, pues éste no es válido en vista de la prioridad de *Loxia cucullata* BODDAERT, p. 24 y *Loxia cucullata* MÜLLER 1776. Cf. MATHEWS and IREDAL, The Austral Avian Record, vol. iii, N.º 2, Nov. 1915, p. 38.

= *Paroaria cucullata* aut.]

*Paroaria cucullata* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 129  
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth  
ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 168 (Santa Elena, Urugu-  
ay — Oct. a Mayo)

N.º 8965 ♀". ♀ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. — ANTONIO POZZI.

Familia Icteridae

(Boyeros, tordos, federales, etc.)

77. **Molothrus bonariensis bonariensis** (GMELIN).

(TORDO NEGRO)

[*Tanagra*] *bonariensis* GMELIN, Syst. Nat. I, p. 898 (1789 — Habitat in  
*Bonaria*) descr. orig.

*Molothrus bonariensis* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 133  
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth  
ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 172 (Uruguay).

N.º 8965 ♂". ♂ ad. Isla Martín García, Dic. 1, 1916. — ANTONIO POZZI.

78. **Molothrus brevirostris** (D'ORBIGNY et LAFRESNAYE).

(TORDO)

*Icterus brevirostris* D'ORBIGNY et LAFRESNAYE, Syn., Av. I, in Mag. Zool.  
(8) cl. II, p. 7 (1838 — Maldonado, Rep. Uruguay) descr. orig.

*Molothrus rufoaxillaris* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 134  
(Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth  
ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 172 (Santa Elena y Santa  
Ana, Uruguay).

N.º 8965 ♂". ♂ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. — ANTONIO POZZI.

79. **Molothrus badius** (VIEILLOT).

(MULATA, TORDO BAYO)

*Agelaius badius* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XXXIV, p. 535  
(1819 — fundada sobre «Tordo pardo-roxizo» AZARA, Apunt. I,  
1802, p. 290, N.º LXIII — Paraguay y Río de la Plata) descr. orig.

*Molothrus badius* APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April  
1894, p. 172 (Uruguay) (criando en Mayo).

N.º 8965 ♂". ♂ no enteramente adulto. Isla Martín García, Enero 14.  
1917 — ANTONIO POZZI.

80. **Agelaius thilius chrysocarpus** (VIGORS).

(TORDO DE LAGUNA)

[*Turdus thilius* MOLINA, Saggio St. Nat. Chili, p. 345, 1782. — Chile].

*Xanthornus chrysocarpus* VIGORS, Proc. Zool. Soc. Lond. 1832, p. 3 (1832 — Paraguay) descr. orig.

*Agelaeus thilius* (nec MOLINA) BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 134 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 173 (Uruguay).

N.º 8965 u" ♀ ad. Isla Martín García, Dic. 22, 1916. — ANTONIO POZZI.

**[81. *Leistes militaris superciliaris* (BONAPARTE).]**

(PECHO COLORADO)

[*Tanagra militaris* LINNAEUS, Syst. Nat. ed. X, I, p. 178 (1758 — Guiana)]

*Trupialis superciliaris* BONAPARTE, Conspl. Av., I, p. 430 (1850 — Mexico, hab. subst. Brasil).

*Leistes superciliaris* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 136 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)

Observado en la isla.]

**82. *Xanthornus pyrrhopterus pyrrhopterus* (VIEILLOT).**

(BOVERITO)

*Agelaius pyrrhopterus* VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XXXIV, p. 543 (1819 — fundada sobre «Tordo negro cobijas de canela» AZARA, Apunt., I, 1802, p. 318, N.º LXXIV — Paraguay) descr. orig.

*Icterus pyrrhopterus* BARROWS, Bull. Nutt. Orn. Club, VIII, 1883, p. 133 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

N.º 8965 v". ♂ jov. Isla Martín García, Enero 17, 1917. — ANTONIO POZZI.

N.º 8965 w". ♀ ad. Isla Martín García, Dic. 21, 1916. — ANTONIO POZZI.

**LA ORNITOLOGÍA FANTÁSTICA DE LOS  
CONQUISTADORES**

POR

ANÍBAL CARDOSO

(Conclusión — véase pág. 153)

Llegó el turno a los Picaflores. ¡Estos sí que tienen notable y fabulosa historia! Y no se crea que iremos a buscar entre los inocentes navegantes del siglo XVI los fantásticos relatos; no, ... son los naturalistas de esa época que engañados por la credulidad de los padres jesuítas nos darán maravillosas des-