
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Notas sobre aves del Paraguay

Winkelried Bertoni de, A.

1924

Cita: Winkelried Bertoni de, A. (1924) Notas sobre aves del Paraguay. *Hornero* 003 (03) : 279-279

www.digital.bl.fcen.uba.ar

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

NOTAS SOBRE AVES DEL PARAGUAY

ELANOIDES FORTICATUS FORTICATUS (L.). — *Taguató-dyetapá*

Desde mis principios he notado discordancia entre los autores en la manera de expresar el color del manto de esta especie; por lo tanto, tomé apuntes de todos los ejemplares paraguayos que obtuve. Ultimamente Chapman separó los ejemplares sudamericanos como una subespecie: *yetapa* (Vieill.).

Y bien, uno de los especímenes que cacé en Puerto Bertoni (Paraguay) tenía el color del dorso que corresponde a la forma típica del hemisferio norte, tal como lo establece Chapman para distinguirla de la forma *yetapa*. No podría yo asegurar en este momento que no se trate de un individuo joven, pero no me extrañaría que la forma típica extienda sus vuelos por el Paraguay, pues es especie de paso que llega aquí por Agosto y se retira invariablemente por Marzo, no se sabe con exactitud hasta donde.

Otro falconido que viaja todos los años en la misma época es la *Ictinia plumbea* (Gm.). Ambas son especies puramente insectívoras, que jamás cazan aves, y por lo tanto, dignas de toda protección.

THLYPOPSIS SORDIDA (Lafr. & Orb.)

Este tanágrido que con Hartlaub considero idéntico al número 113 de Azara, apareció a principios de 1922 en el Parque y Museo Municipal de Asunción, que es un bosque artificial.

Otra especie igualmente mal conocida en el Paraguay, es *Atlapetes citrinellus* Cab., que hallé en Abril de 1920 en los bosques del río Aguarañ-guasú (N. del Paraguay). Queda pues, confirmada la existencia de ellas en el país; pero parece que no llegan al Alto Paraná.

MYIOPAGIS CANICEPS (Pelz.)

Esta especie, que tantos embrollos causó a causa de la variabilidad de su coloración según la edad, es de las más comunes en Puerto Bertoni, todo el año. Un hecho que debe llamar la atención es la variación individual de los escudos tarsales, mucho más marcada que en *M. viridicata* (Vieill.), y, a veces, una aparente transición a la forma *pienaspideana*.

La cara postero-interior del tarso es a veces más o menos granulosa o con una hilera de escuditos cuadrados más o menos extensa hacia el costado postero-exterior. Estos detalles sensibles en los ejemplares frescos se modifican o desaparecen en las pieles secas.

Pero, comparando con *Acrochordopus* y otro géneros miméticos de Cotingidos, se nota desde luego que los escudos siempre envuelven más la parte exterior del tarso.

Con todo, el nuevo concepto de la familia liga íntimamente a los Tyrannidae y Cotingidae, siendo difícil colocar entre ellas los Pipridae como se acostumbra.

A. DE W. BERTONI.