

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Aves observadas en el sur de la provincia de Buenos Aires Marelli, C. A. 1933

Cita: Marelli, C. A. (1933) Aves observadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 005 (02) : 193-199

## AVES OBSERVADAS EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES <sup>(1)</sup>

Por CARLOS A. MARELLI

### Familia Rheidae (*Avestruces, ñandúes*)

**Rhea americana Rothschildi** Brab. y Chubb. « Ñandú ». Arroyo Pareja, 1931.

### Familia Tinamidae (*Perdices*)

**Rhynchotus rufescens pallescens** Kothe. « Perdiz martineta ». Saldungaray.

**Nothura d. darwini** Gray. « Perdiz chica ». Bahía Blanca (Darwin).

**Nothura m. maculosa** (Temm.) « Perdiz chica ». Estancia Sierra de la Ventana, Saldungaray.

**Eudromia e. elegans** Orb. et Geoffr. « Perdiz copetona ». Estancia Sierra de la Ventana, Saldungaray.

### Familia Colymbidae (*Macaes, zambullidores*)

**Colymbus o. occipitalis** (Garnot). « Macacito ». Estancia Sierra de la Ventana.

### Familia Phalacrocoracidae (*Biguas o cormoranes*)

**Phalacrocorax o. olivaceus** (Humboldt). « Biguá ». Bahía Blanca. Sierra de la Ventana.

### Familia Ardeidae (*Mirases, garzas*)

**Nycticorax nycticorax naevius** (Boddaert). « Bruja ». Saldungaray.

### Familia Ciconiidae (*Cigüeñas*)

**Euxenura galeata** (Mol.) « Cigüeña ». Dorrego, junio de 1931.

### Familia Plataleidae (*Espátulas, cucharas*)

**Ajaia ajaja** (Linn.). « Espátula ». Dorrego.

(1) La presente enumeración incluye las aves coleccionadas y observadas por el Dr. Carlos A. Marelli, durante la excursión efectuada en los meses de Noviembre y Diciembre del año último, a la que nos referimos en otro lugar de esta misma entrega. Las figuras son copias al natural hechas según indicaciones del autor. (Nota de EL HORNERO)

Familia **Anatidae** (*Gansos, avutardas, patos*)

**Chloëphaga dispar** (Phil. y Landb.) « Avutarda ». Dorrego, junio de 1931. Cautivas en el Jardín Zoológico de Bahía Blanca en noviembre de 1932.

**Chloëphaga rubidiceps** Sel. « Avutarda ». Bahía Blanca, Dorrego, junio de 1931.

**Chloëphaga poliocephala** Sel. « Avutarda ». Bahía Blanca, Dorrego, junio de 1931.

**Anas spinicauda** Vieill. « Pato barcino o maicero ». Bahía Blanca.

**Anas fl. flavirostris** Vieill. « Pato barcino chico ». Estancia Sierra de la Ventana, Saldungaray.

Familia **Cathartidae** (*Buitres*)

**Catharista atratus brasiliensis** (Bp.). « Buitre de cabeza negra ». Bahía Blanca, adultos y jóvenes.

**Cathartes a. aura** (Linn.). « Buitre de cabeza roja ». Bahía Blanca.

Familia **Falconidae** (*Caranchos, chimangos, halcones*)

**Polyborus pl. plancus** (J. F. Mill.). « Carancho ». Dorrego, junio de 1931.

**Milvago ch. chimango** (Vieill.). « Chimango ». Estancia Sierra de la Ventana, Fortín Chaco, Saldungaray.

**Elanus l. leucurus** (Vieill.). « Halcón plateado ». Dorrego, junio de 1931.

**Geranoaetus melanoleucus australis** Swann. « Aguila ». Fortín Chaco, Bahía Blanca.

**Buteo poliosoma** (Quoy et Gaimard). « Aguilucho ». Fortín Chaco, Bahía Blanca.

**Falco sparverius cinnamomina** Swainson. « Halconcito », 1931, Sierra de la Ventana, 1932.

Familia **Rallidae** (*Gallaretas, gallinetas*)

**Fulica leucoptera** Vieill. « Gallareta ». Fortín Chaco, Saldungaray, Sierra de la Ventana.

Familia **Laridae** (*Gaviotas, gaviotines*)

**Larus maculipennis** Licht. « Gaviota cabeza negra ». Tornquist, Bahía Blanca.

**Larus cirrhocephalus** Vieill. « Gaviota cabeza gris ». Tornquist, Bahía Blanca.

**Larus dominicanus** Licht. « Gaviota cocinera ». B. Blanca, junio de 1931.

Familia **Charadriidae** (*Teros, chorlos, agachonas*)

**Belonopterus chilensis lampronotus** (Wagler). « Teru-teru ». Fortín Chaco, Bahía Blanca, Arroyo Parejas, junio de 1931.

**Aegialitis falklandica** (Lath.). « Chorlito ». Bahía Blanca, Quequén chico, junio de 1931.

**Zonibyx modestus** (Licht.). « Chorlito ». Saldungaray.

**Oreophilus r. ruficollis** (Wagl.). « Chorlo cabezón ». Coronel Dorrego, (Perez Bustos), febrero de 1933.

Familia **Procellariidae** (*Petrelas*)

**Oceanites o. oceanicus** (Kuhl.). « Petrel de las tormentas ». Costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, Balneario de Monte Hermoso, junio de 1931, Dorrego.

Familia **Spheniscidae** (*Pingüinos*)

**Spheniscus magellanicus** (Forster). « Pájaro niño, pingüino ». Costa atlántica de la provincia de Buenos Aires.

Familia **Columbidae** (*Palomas*)

**Zenaida a. auriculata** (Des Murs). « Torcaza ». Todo el sur de la provincia.

**Columbina p. picui** (Temm.). « Palomita ». Estancia Sierra de la Ventana.

**Columba livia caveae** n. var. « Paloma barranquera ». Sierra de la Ventana, en las barrancas del arroyo Sauce Chico, Saldungaray.

Familia **Cuculidae** (*Urracas*)

**Guira guira** (Gm.). « Urraca o pirincho ». Estancia de la Ventana, Fortín Chaco, Saldungaray y Puerto Belgrano.

Familia **Psittacidae** (*Loros, cotorras*)

**Cyanolyseus p. patagonus** (Vieill.). « Loro barranquero ». DABBENE: *Orn. Arg.*, pág. 257.

Familia **Asionidae** (*Lechuzas, lechuzones*)

**Asio fl. flammeus** (Pont.). « Lechuzón de campo ». Dorrego, junio de 1931. Puerto Belgrano, zona militar, 28 de noviembre de 1932

**Speotyto c. cunicularia** (Mol.). « Lechucita de las vizcacheras ». Bahía Blanca y Dorrego, 1931. Bahía Blanca, Tornquist, 1932.

Familia **Tytonidae** (*Buhos*)

**Tyto alba tuidara** (Gray). « Lechuzón de las parvas. Lechuzón de iglesia ». 1931, Barrancas del Arroyo Napostá, Tornquist.

Familia **Picidae** (*Carpinteros*)

**Soroplex campestroides** (Mahl.). « Carpintero ». Sierra de la Ventana, Tornquist, Bahía Blanca.

Familia **Alcedinidae** (*Martín pescadores*)

**Chloroceryle americana viridis** (Vieill.). « Martín pescador pequeño ». Saldungaray.

Familia **Caprimulgidae** (*Dormilones*)

**Podager n. nacunda** (Vieill.). « Bocón ». (Venturi), Bahía Blanca.

Familia **Trochilidae** (*Picaflores*)

**Chlorostilbon aureo-ventris** (Orb. et Lafr.). « Picaflor ». El Retiro, Saldungaray.

Familia **Dendrocolaptidae** (*Horneros, leñateros, camineras*)

**Geositta c. cunicularia** (Vieill.). « Caminera ». Saldungaray, Cuatros, (Viticola 1931).

**Furnarius r. rufus** (Gm.). « Hornero ». Sur de la provincia de Buenos Aires.

**Cinclodes f. fuscus** (Vieill.). Bahía Blanca.

**Siptornis sordida flavogularis** (Gould). Bahía Blanca.

Familia **Tyrannidae** (*Tijeretas, churrinches, benteveos, etc.*)

**Agriornis montana maritima** (Lafr. et Orb.). Sierra de la Ventana, Bahía Blanca.




FIG. 1. — Tijereta, *Muscivora tyrannus*.

**Lichenops p. perspicillata** (Gm.). « Pico de plata ». Sierra de la Ventana.

**Habrura p. pectoralis** (Vieill.). Bahía Blanca.

**Serpophaga nigricans** (Vieill.). « Piojito de ribera ». El Retiro, Saldungaray.

**Xolmis rubetra** (Burm.). Bahía Blanca.

**Suiriri suiriri** (Vieill.). Bahía Blanca.

**Pitangus sulphuratus bolivianus** (Lafr.). « Bienteveo ». Dorrego, 1931. Estancia Sierra de la Ventana, Saldungaray.

**Pyrocephalus r. rubinus** (Bodd.). « Churrinche ». Estancia Sierra de la Ventana.

**Muscivora tyrannus** (Linn.). « Tijereta ». Sierra de la Ventana, Puerto Belgrano.

Familia **Hirundinidae** (*Golondrinas*)

**Progne furcata** Baird. « Golondrina negra ». Bahía Blanca (Barrow).

**Progne chalybea domestica** (Vieill.). « Golondrina doméstica ». Fortín Chaco, Bahía Blanca.

**Pygochelidon cyanoleuca patagonica** (Lafr. et Orb.). « Golondrina ». Saldungaray, Cuatrerros.

Familia **Troglodytidae** (*Ratonas*)

**Cistothorus pl. platensis** (Lath.). « Ratona ». Bahía Blanca.

**Troglodytes musculus hornensis** (Less.). « Ratona ». Sierra de la Ventana, Puerto Belgrano, Bahía Blanca.

Familia **Mimidae** (*Calandrias*)

**Mimus saturninus modulator** (Gould). « Calandria ». Sierra de la Ventana.

Familia **Sylviidae** (*Piojitos*)

**Polioptila dumicola** (Vieill.). « Piojito azulado ». Saldungaray, El Retiro.

Familia **Motacillidae** (*Cachirlas*)

**Anthus f. furcatus** Orb. et Lafr. « Cachila ». Sierra de la Ventana, Puerto Belgrano, Cuatrerros.

Familia **Fringillidae** (*Corbatitas, mixtos, chingolos*)

**Sporophila caerulescens** (Vieill.). « Corbatita ». Estancia Sierra de la Ventana.

**Spinus i. ictericus** (Leht.). « Cabecita negra ». Dorrego (1931) Fortín Chaco.

**Sicalis pelzelni** Sel. « Jilguero ». Fortín Chaco. Bahía Blanca.

**Sicalis a. arvensis** (Kittl.). « Misto ». Sur de la provincia de Buenos Aires, Sierra de la Ventana.

**Passer domesticus** (L.). « Gorrión ». Sur de la provincia, Puerto Belgrano, Cuatrerros.




FIG. 2. — Ratona, *Troglodytes m. hornensis*.



FIG. 3. — Pecho colorado, *Leistes m. supercilii*.




FIG. 4. — Pecho amarillo, *Pseudoleistes virescens*.



FIG. 5. — Pecho colorado, *Trupialis militaris*.

**Brachypiza capensis argentina** Todd. « Chingolo ». Sierra de la Ventana. Puerto Belgrano.

**Myospiza humeralis manimbe** (Leht.). Bahía Blanca.

**Embernagra platensis** (Gm.). « Verdón ». Napostá (1931). Cuatrosos (1932).

Familia **Icteridae** (*Tordos, pecho colorados, etc.*)

**Molothrus b. bonariensis** (Gm.). « Tordo ». Sur de la provincia de Buenos Aires, Saldungaray, Fortín Chaco, Dorrego, Puerto Belgrano.

**Agelaioides b. badius** (Vieill.). « Músico ». Fortín Chaco.

**Leistes militaris superciliaris** (Bp.). « Pecho rojo menor ». Sierra de la Ventana, Bahía Blanca.

**Pseudoleistes virescens** (Vieill.). « Dragón o pecho amarillo ». Fortín Chaco.

**Trupialis m. militaris** (Linn.). « Pecho colorado ». Todo el sur de la provincia.

**Trupialis Defilippii** Bp. « Pecho colorado ». Todo el sur de la provincia.

## OBSERVACIONES SOBRE EL NIDO DEL « JUNQUERO » (PHLOEOCRYPTES MELANOPS)

POR EMILIANO J. MAC DONAGH

En la colección de nidos de aves argentinas existente en el Museo de La Plata figuran algunos ejemplares del nido del « junquero » o « siete cuchillas », *Phloeocryptes melanops melanops* (Vieillot), provenientes de Punta Lara, en las vecindades de la ciudad de La Plata, sobre la costa del río, y de la cañada llamada de Arregui, cruzada por el camino que va de nuestra ciudad a Magdalena. Como quiera que los nidos de este último lugar los coleccioné personalmente, practicando observaciones en el lugar, aprovecho para estudiarlos en estas páginas, ampliando lo publicado sobre ellos.

Hudson <sup>(1)</sup> dice, en substancia, que el nido, por lo común, está sostenido por tres juncos; que « es techado, de forma oval, como de nueve pul-

(1) « *Argentine Ornithology. A descriptive catalogue of the Birds of the Argentine Republic* by P. L. SCLATER, ... with notes on their habits by W. H. HUDSON, *C. M. Z. S.*, late of Buenos Ayres ». London, 1888, vol. I, págs. 174-176. HUDSON, *Birds of La Plata*. London, Dent, 1920, vol. I, págs. 205-208. Hudson llama a esta ave « rush-loving spine-tail », traducción adaptada de junquero; Cozy-Hellmayr, « black-faced spine-tail » por el nombre específico. Me parece preferible usar el de « junquero » al de « siete cuchillas »: es más criollo y masculino...