

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Notas sobre algunas aves de Pradere (F. C. O.) Harper, E. C. 1935

Cita: Harper, E. C. (1935) Notas sobre algunas aves de Pradere (F. C. O.).  
*Hornero* 006 (01) : 091-094

## NOTAS SOBRE ALGUNAS AVES DE PRADERE (F.C.O.)

Por EDUARDO C. HARPER

**Fluvicola albiventer** (Spix). «Viudita». — Este bonito tiránido, propio del norte, fué observado por primera vez en la región en Enero último habiendo nidificado cerca de un tanque australiano rodeado de cañas, lo que es más raro aún. El nido, construido en la forma habitual, análoga



FIG. 1. — Nido del tiránido. «Pampita» o «Viudita» (*Fluvicola albiventer*).

al del junquero, tenía material ralo y parecía inconcluso. Llama la atención que ésta especie, que solo vive cerca de los ríos, haya nidificado en esta localidad, situada a 450 kilómetros del Río de la Plata, y a 200 km. del río más cercano, y con vegetación muy escasa. Puede suponerse que en su desplazamiento migratorio haya pasado el límite habitual y haya quedado en el sitio que le pareció más favorable.

**Tyto alba tuidara** (Gray) . «Lechuzón de campanario joven». — Especie no muy común en el lugar, talvez por falta de sitios adecuados para nidificar, pues se ha observado que buscan de preferencia las paredes de los pozos, y en cuanto se hace algún boquete en un jagüel no tarda en ser ocupado por una pareja de este lechuzón. Durante el invierno he observado un ejemplar sobre una planta de ligustro, el que desapareció en la primavera. El pichón de la foto fué sacado de un pozo de molino, despojado de la madre por unos obreros. Criado guacho en cautividad se mantuvo agresivo y no llegó a amansarse del todo. Sus armas temibles eran las uñas y no era



FIG. 2. — Pichón de huho o lechuzón de campanario, *Tyto alba tuidara*.

prudente tocarlo sin guantes o alguna protección. Cuando se le molestaba hacía sonar el pico amenazador. Desde cuando tenía pocas semanas se tragaba lauchas enteras, y en defensa de la especie debo agregar que habiendo examinado muchos residuos (unos centenares), de los que pasan el invierno en el monte, he comprobado que solo dos contenían vestigios de pájaros y todos los demás restos de lauchas y coleópteros. Después de adulto el lechuzón fué soltado y a los pocos días desapareció.

**Chauna torquata** (Oken). «Chajá». — Un ejemplar en cautividad desde hace 20 años ha buscado un compañero o compañera silvestre. Este nuevo hésped se retira de noche y vuelve al día siguiente. Después de dos meses parece dispuesto a quedarse definitivamente. El cautivo no puede volar por tener el ala quebrada, sino es probable que se habría alejado con el forastero. De modo que si el idilio se formaliza tendrá que ser en cautividad.

**Phoenicopterus chilensis** Mol. «Flamenco». — Este ejemplar fué capturado en una laguna cerca del camino, encandilado por los focos



FIG. 3. — Cisne de cuello negro, *Cygnus melancoryphus* y flamenco, *Phoenicopterus chilensis*, en domesticidad.

del automóvil. Se amansó enseguida y se hizo inseparable del cisne de cuello negro, que fué criado cautivo desde pichón. Ambos se mantienen con pan y leche.

**Planesticus f. fuscater** (Orb. et Lafr.). «Zorzal negro». — Esta especie es, como se sabe, propia de las Sierras de Córdoba y solo por excepción



FIG. 4. — Zorzal negro de las sierras, *Planesticus f. fuscater*, en nidificación.

se han visto en la zona algunos ejemplares de paso. En el año 1932 se soltaron aquí tres pichones para ver si se adaptaban al ambiente. Uno era macho y se murió. Las dos hembras permanecieron y nidificaron, poniendo huevos. El ejemplar de la foto ha construido ya cinco nidos durante este año y puesto cuatro huevos en cada uno. Se trató de introducir machos, adquiridos en las pajarerías de la Capital, pero los rechaza la hembra y pronto se van. Parece que notara alguna diferencia entre los porteños y los córdobeses, pues uno traído de las Sierras fué recibido con mucho agrado, pero se ahogó antes del tiempo de la postura. Talvez haya realmente alguna diferencia entre los zorzales de esta misma especie de Córdoba y los que se venden en la Capital, los que supongo proceden del Delta o de Entre Ríos.

**Captura de la gallineta azul, *Ionornis martinica*.** — En el mes de Febrero último fué encontrado un ejemplar herido de la vistosa gallareta o gallineta azul, *Ionornis martinica* (L.), a la que le faltaba un ala. El



FIG. 5. — Gallineta azul, *Ionornis martinica*, capturada accidentalmente en Pradere (F. C. O.).

accidente, ocurrido al parecer recientemente, dado el aspecto de la herida, debió interrumpir el vuelo del ave y producir su descenso en un lugar alejado de su habitat normal. Como se sabe, esta especie es propia del norte y del litoral, en donde ha sido cazada pocas veces y nunca fué señalada en el centro del país, ni en esta región que linda con La Pampa. De modo que puede atribuirse su presencia en esta localidad a un accidente producido durante uno de esos vuelos nocturnos que suelen efectuar los rálidos, o talvez arrastrado por una tormenta.

Pradere (F. C. O.). Enero de 1935.