

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Sinopsis de los Ciconiiformes argentinos Zotta, A. R.; Da Fonseca, S. 1936

Cita: Zotta, A. R.; Da Fonseca, S. (1936) Sinopsis de los Ciconiiformes  
argentinos. *Hornero* 006 (02) : 240-248

## SINOPSIS DE LOS CICONIIFORMES ARGENTINOS

Por ANGEL R. ZOTTA y SECUNDINO DA FONSECA

(Continuación de la pág. 58)

Género: *Nycticorax* T. FORSTER

*Caracteres.* — Doce rectrices; tibia en el quinto inferior desnuda; dedo externo apenas más largo que el interno; tres pares de polvo-plúmulas; región malar completamente emplumada; pico algo más corto que el tarso-metatarso y este igual al dedo medio con uña; *tomium* liso; *pileum* con dos o tres plumas muy largas, estrechas y blancas; escapulares normales.

Comprende este género once especies-subespecies, estando representada en la Argentina dos de ellas.

A) Frente cruzada por una banda blanca, región anterior del cuerpo también blanca o bien ambarino (adulto).

..... N. NYCTICORAX HOACTLI

AA) Frente cruzada por una banda grisácea, región anterior del cuerpo gris azulado (adulto).

..... N. NYCTICORAX OBSCURUS

### *Nycticorax nycticorax hoactii* (GMELIN)

(Fig. 7)

*Ardea Hoactli* Gmelin.

*Nom. vulg.* « Bruja », « Pájaro bobo ».

*Descripción.* — Macho y hembra semejantes, color general gris blanuzco. Corona de la cabeza negra con reflejos metálicos, salvo la frente que está cruzada por una franja blanca, que a veces se extiende por la región superciliar hasta la comisura posterior del ojo; *pileum* con dos o tres plumas blancas, siendo sus barbas cortas y compactas; región posterior y lateral del cuello ceniciento; dorso con plumas de color negro metálico, afectando en conjunto un amplio escudo triangular; garganta, cuello, tórax y abdomen blancos y según la edad varía del tinte ambarino al grisáceo.

*Alas.* — Remiges primarias y secundarias gris perla igual que las tectrices; álula del mismo color; axilares cenicientas; borde blanco.

*Cola.* — Coloración de las rectrices y tectrices superiores en uniformidad con las remiges y tectrices inferiores blancas.

*Pico.* — En general negruzco, siendo la mandíbula algo teñida de amarillo verdoso, *lorum* amarillo verdoso, iris rojo.

*Patas.* — Amarillo limón.

*Dimensiones.* — (mm) Culmen 70, Tarso-metatarso 70, Dedo medio 70, ala 300, cola 116.

*Joven.* — En general jaspeado. Cabeza, parte posterior del cuello y dorso castaño con las plumas estriadas longitudinalmente en el centro de blanco; garganta blanca igual que la región anterior del cuello y tórax, pero en éstas las plumas están cruzadas longitudinalmente por una ancha franja castaño; partes inferiores del abdomen blancuzco.

*Alas.* — Primarias castaño uniforme con las puntas maculadas de blanco; secundarias y terciarias castaño, pero más claras por su cara interna; tectrices también del mismo color, castaño y con ocelos blancos.

*Cola.* — Castaño plumizo, algo más atenuado hacia la extremidad.

*Pico.* — Mandíbula superior de color chocolate obscuro, con el *tomium* amarillento, color este que se extiende por toda la mandíbula inferior; iris amarillo; *lorum* verde.

*Patas.* — Verdes.

*Material consultado.* — Buenos Aires (Quilmes ♂ 9291, Luján jov. 298 a, Sierra de la Ventana ♂ jov. 2152 a, La Plata ♂ 4202, Las Flores ♂ 2724 a, Quilmes ♂ 9563, Barracas ♂ 4 c, Río Saladillo ♀ 8913, Las Flores ♀ 2724 a, Escobar ♂ 3753 a, ♀ 2223 a); Salta (♂ 4320 jov. 4320); Jujuy (jov. 2830 a); Formosa (jov. 2248 a); Chaco (♀ 390); Córdoba (Valle de los Reartes ♂ 9649); Tucumán (♀ 4326 ♂ 994); Uruguay (jov. 90 a).

*Distribución.* — Norte del Chubut, por todo el territorio hasta las provincias y territorios norteños.

#### *Nycticorax nycticorax obscurus* BONAPARTE

*Nycticorax obscurus* Bonaparte.

*Ardea cyanocephala* Molina.

*Nom. vulg.* «Cachi», «Pájaro yaguá».

*Descripción.* — Macho y hembra semejantes, color general gris azulado. Corona de la cabeza azul metálico; plumas ornamentales de la nuca no tan largas como en la subespecie anterior; frente gris azulado, pero no bien definido como en aquella; cuello y parte inferior del cuerpo de color uniforme azul y a veces con tinte castaño.

*Alas y cola.* — Del color de la anterior pero más teñida.

*Pico.* — En general negruzco, mandíbula inferior y contorno del *tomium* de la superior algo amarillento; *lorum* amarillo verdoso; iris anaranjado.

*Patas.* — Amarillo verdoso.

*Dimensiones.* — (mm) Culmen 75, Tarso-metatarso 77, dedo medio 76, ala 280, cola 125.

*Joven.* — Semejante a *N. n. hoactli* (Gmelín).

*Material consultado.* — Chubut (Río Chubut ♀ 8339, ♂ 8339, ♀ 8339); Santa Cruz (Puerto Deseado, jov. 2478).

*Distribución.* — Chubut, Neuquén (?), Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Archipiélago adyacente al Cabo de Hornos.

Género: **Tigrisoma** SWAINSON

*Caracteres.* — Doce rectrices; tibia apenas desnuda en su porción inferior; dedo externo sensiblemente igual al interno; tres pares de polvo-plúmulas; pico casi igual en longitud al tarso-metatarso; garganta emplumada en forma de banda en la porción central; dorso con plumas normales; *pileum* sin plumas ornamentales. Comprende este género 5 especies-subespecies, tres de las cuales se pueden señalar en la Argentina. En general son de tamaño grande, y con el plumaje juvenil semejante.

A) Corona de la cabeza de color castaño (adulto) o amarillo ocre con bandas transversales negras (joven), Región ocular, no emplumada hasta más allá de la comisura anterior del ojo.

..... T. LINEATUM MARMORATUM

AA) Corona de la cabeza de color negro (adulto) o amarillento con bandas transversales negras (joven).

a) Región lateral del cuello rojo ladrillo uniforme.

..... T. BOLIVIANUM

b) Región lateral del cuello negro con finas estriás transversales amarillo oro. Región ocular emplumada hasta más allá de la comisura anterior del ojo.

..... T. FASCIATUM

**Tigrisoma lineatum marmoratum** (VIEILLOT)

(Fig. 8)

*Ardea marmorata* Vieillot.

*Nom. vulg.* «Hocó», «Okó», «Garza colorada».

*Descripción.* — Macho y hembra semejantes, color general azul oscuro. Cabeza, regiones laterales y posterior del cuello. castaño rojizo; dorso con reflejos verde oscuro y con el raquis de las plumas negro, igual que las porciones de las barbas adyacentes (origen), siendo en su región marginal por el contrario salpicado de amarillo; garganta emplumada en el centro y desnuda en los costados, con sus contornos marginados de plumas negras y blancas en forma de collar, disposición que se extiende por la porción anterior del cuello, formando en toda su extensión una franja parda; tórax y abdomen gris azulado uniforme a igual que los muslos; flancos con plumas largas, de color negro pero estriadas transversalmente de blanco.

*Alas.* — Remiges primarias y secundarias gris apizarrado con los ápices apenas manchados de blanco a igual que el álula; tectrices en uniformidad con el dorso; axilares iguales que los flancos; borde del ala blanca.




FIG. 7. — Bruja o Pájaro bobo, *Nycticorax nycticorax hoactli* (Gm.). Reducida a  $\frac{1}{2}$  del natural. 1) cola vista por su cara inferior; 2) ala vista por su cara interna; 3) pico visto por su cara superior; 4) pico visto por su cara inferior; 5) uña del dedo medio con el borde pectinado.




FIG. 8. — Garza colorada u Hocó, *Tigrisoma lineatum marmoratum* (Vieill.). Reducida a  $\frac{1}{3}$  del natural. 1) cola vista por su cara inferior; 2) ala vista por su cara interna; 3) pico visto por su cara superior; 4) pico visto por su cara inferior; 5) uña del dedo medio con el borde pectinado.

*Cola.* — Rectrices azul verdoso; tectrices inferiores negruzcas, a menudo salpicadas de puntitos blancos; superiores semejantes al dorso.

*Pico.* — Amarillo obscuro; mandíbula superior y bordes de la inferior negruzcos, serrado en su extremidad; *lorum* amarillo verdoso; iris-amarillo.

*Patas.* — Amarillo verdoso obscuro.

*Dimensiones.* — (mm) Culmen 104, Tarso-metatarso 106, dedo medio 85, ala 350, cola 147.

*Joven.* — En general jaspeado, siendo las vetas transversales y de colores negro y canela, colores que se intensifican en el dorso y las alas; abdomen casi blancuzco y antes de alcanzar el plumaje característico se tiñe de rojo ladrillo; plumas rectrices negras, atravesadas transversalmente por estrías blancas; flanco semejante al adulto pero con las bandas blancas más anchas.

Las plumas de la corona y nuca son las primeras que cambian al pasar al plumaje definitivo, cambiando por castaño las porciones antes amarillas.

*Material consultado.* — Formosa (Las Lomitas ♀ 2248 a, ♂ 2248 a, Fontana ♀ 2248 a, ♀ 2248 a, Reducción ♂ 2248 a); Misiones (jov. 2788 a); Buenos Aires (♀ 3476 a); Jujuy (jov. 2933 a); Paraguay (♀ 2055 a); Bolivia (♀ 6908, jov. 5586).

*Distribución.* — Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Tucumán, Salta hacia el este alcanzando a los países limítrofes.

#### **Tigrisoma bolivianum (LÖNNBERG)**

*Heterocnus bolivianum* Lönnberg.

*Nom. vulg.* «Hocó fajado».

*Descripción.* — Macho y hembra semejantes, color general grisáceo obscuro. Cabeza de color negro casi metálico, cresta occipital castaño-uniforme, con algunas de las plumas salpicadas de chispitas negras; región posterior y lateral del cuello marrón rojizo uniforme; dorso grisáceo obscuro con tinte verde oliva, más bien fuerte en algunos sitios; todas las plumas tienen en su centro una flecha negra y moteada en toda su extensión de ocre; órbitas desnudas, con una estrecha franja negra que separa el área desnuda de las plumas auriculares rojiza con respecto a las del costado nucal; esta banda negra se extiende por debajo de la garganta estando en esta porción rayada de blanco, continuando por el cuello hasta la porción inferior, donde se ensancha cambiando el blanco por castaño; tórax gris apizarrado con los ápices de las plumas cruzados por una franja de color fresa; abdomen más claro; flanco y plumas axilares apizarrado con vetas onduladas y estrechas de color blanco.

*Alas.* — Remiges primarias y secundarias gris apizarrado obscuro con tinte castaño en las barbas exteriores y con los ápices blancos; tectrices en uniformidad con el dorso.

*Cola.* — Rectrices gris obscuro con reflejos verdosos; tectrices inferiores y superiores gris azulado.

*Pico.* — De un severo color negro, salvo el *gonys* que presenta un color cuerno; *lorum* amarillo verdoso; iris castaño.

*Patas.* — Verdoso amarillento obscuro.

*Dimensiones.* — (mm) Culmen 108, Tarso-metatarso 110, ala 355, cola 148.

*Joven.* — Semejante a *T. l. marmoratum* (Vieillot) (?).

*Distribución.* — Corrientes, según A. Wetmore, EL HORNERO, Vol. 2, N° 4, 1922, p. 292.

#### **Tigrisoma fasciatum (SUCH)**

*Ardea fasciata* Such.

*Nom. vulg.* «Hocó negro».

*Descripción.* — Macho y hembra semejantes, color general negruzco. Cabeza y *pileum* negro mate; región posterior y lateral del cuello con bandas transversales amarillas, las plumas posteriores son en general más largas; dorso verde obscuro con reflejos metálicos; garganta blanca, color que continúa por la parte anterior del cuello en forma de franja surcada de color café; tórax y abdomen de color castaño claro; flancos y muslos de un gris negruzco.

*Alas.* — Remiges primarias y secundarias negro azulado excepto los ápices que son blancos.

*Cola.* — Rectrices negro verdoso; tectrices inferiores oscuras con ligero tinte blancuzco.

*Pico.* — Mandíbula superior negra, base de la inferior amarilla; *lorum* amarillo obscuro; iris amarillo.

*Patas.* — Negras.

*Dimensiones.* — (mm) Culmen 78, Tarso-metatarso 88, dedo medio 69, ala 330, cola 130.

*Joven.* — En general semejante a *T. l. marmoratum* (Vieillot) pero con las bandas amarillas más anchas y más teñido de rojo; tamaño mucho menor.

*Distribución.* — Misiones.

*Observaciones.* — A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 6, N° 1, 1935, p. 106.

#### **Género: Ixobrychus BILLBERG**

*Caracteres.* — Diez rectrices; tibia completamente emplumada; dedo externo más corto que el interno; dos pares de polvo-plúmulas; región malar emplumada; pico más largo que el tarso y dedo medio respectivamente; *tomium* apenas serrado; *pileum* con plumas en forma de copete; dorso con plumas transformadas; color general amarillento. Comprende este género siete especies con varias subespecies, estando representado en la Argentina por una de ellas; se agrupan en este género las garzas de menor tamaño.

**Ixobrychus involucris** (VIEILLOT)

(Fig. 9)

*Ardea involucris* Vieillot.*Nom. vulg.* « Garcita amarilla », « Mirasol ».

*Descripción.* — Macho y hembra semejantes, color general amarillo canela. Cabeza y nuca recorridas por una franja negra central marginada de ocre; lados de la cabeza y cuello de color oro; dorso con plumas relativamente largas y de desarrollo desproporcionado al tamaño del espécimen, todas las plumas están atravesadas en el centro por sendas franjas negras bordeadas de amarillo unas y otras de castaño; garganta y parte anterior del cuello blanco, recorrido meridianamente de amarillo; tórax del color general y sus costados semejantes al dorso; abdomen blanco.

*Alas.* — Remiges primarias y secundarias negras con las porciones terminales de color castaño en áreas relativamente extensas; primera remige con el borde externo blanco a igual que el borde del ala; tectrices del color general con una mancha castaño en el carpo; álula igual que las remiges; axilares blancas.

*Cola.* — En general corta y en armonía con el dorso; tectrices superiores en uniformidad con el dorso, inferiores blancas.

*Pico.* — Color general amarillo, culmen negruzco y con menor intensidad en la base iris y *lorum* amarillo.

*Patas.* — De color amarillo verdoso; uñas largas y estrechas.

*Dimensiones.* — (mm) Culmen 47, Tarso-metatarso 40, dedo medio 39, ala 120, cola 48.

*Joven.* — Similar en general al adulto, pero con predominio de amarillo y blanco.

*Material consultado.* — Buenos Aires (Barrancas jov. ?. Las Flores ♀ 3588 a, Gándara ♂ 2266 a, Lomas de Zamora jov. 4304, La Plata ♀ 4202, Escobar ♀ 3556 a, Las Rosas ♂ 3237 a); Isla Martín García (♂ 8965), Uruguay (Montevideo ♂ 9452).

*Distribución.* — Excepto las provincias andinas, en todo el territorio.

Género: **Botaurus** STEPHENS

*Caracteres.* — Diez rectrices; tibia casi totalmente emplumada; dedo externo más largo que el interno; dos pares de polvo-plúmulas; región malar emplumada; pico casi igual al dedo interno con uña en longitud; *tomium* serrado; *pileum* con plumas normales; uña del *hallux* muy desarrollada; dorso sin plumas transformadas; tamaño en general grande. Comprende este género cuatro especies, estando representada una de ellas, en el territorio argentino.




FIG. 9.—Garcita amarilla o Mirasol, *Ixobrychus involucris* (Vieill.). Reducida a  $\frac{2}{3}$  del natural. 1) cola vista por su cara inferior; 2) ala vista por su cara interna; 3) pico visto por su cara superior; 4) pico visto por su cara inferior; 5) uña del dedo medio con el borde interno pectinado.




FIG. 10.—Mirasol grande u Hocó, *Botaurus pinnatus* (Wagl.). Reducida a  $\frac{1}{2}$  del natural. 1) cola vista por su cara inferior; 2) ala vista por su cara interna; 3) pico visto por su cara superior; 4) pico visto por su cara inferior; 5) uña del dedo medio con el borde interno pectinado.

**Botaurus pinnatus** (WAGLER)

(Fig. 10)

*Ardea pinnata* Wagler.*Nom. vulg.* «Oko», «Hocó», «Mirasol Grande».

*Descripción.* — Macho y hembra semejantes, color general amarillo negrozco. Corona de la cabeza y nuca cruzada transversalmente de amarillo y negro (carácter específico), continuándose por la parte posterior y lateral del cuello; dorso sin plumas transformadas, de color negro y marginadas muy irregularmente de ocre; garganta blanca; parte anterior del cuello con plumas muy espaciosamente estriadas longitudinalmente en el centro de ocre y amarillo y salpicadas en toda su extensión de pintitas negras; tórax y abdomen blanco amarillento y bien delimitado por una franja; flancos y muslos con bandas transversales negras.

*Alas.* — Remiges primarias negruzcas con los ápices bordeados de una fina veta castaño; secundarias negras en su porción externa y salpicadas de amarillo en su porción interna; tectrices en uniformidad con el dorso; álula igual que las remiges primarias; borde blanco; axilares en armonía con los flancos.

*Cola.* — Rectrices negras bordeadas en los ápices de canela; tectrices superiores del color del dorso, inferiores en uniformidad con el abdomen.

*Patas.* — Tarsos verdes; uñas muy desarrolladas y comprimidas lateralmente.

*Pico.* — Culmen castaño con un estrechamiento a la altura de los nares (carácter particular del género), el resto castaño amarillento; *lorum* amarillito verdoso; iris amarillo claro.

*Dimensiones.* — (mm) Culmen 85, Tarso-metatarso 106, dedo medio 104, ala 335, cola 123.

*Joven.* — En general semejante al adulto.

*Material consultado.* — Buenos Aires (Zelaya ♂ 2232 a, Las Flores ♂ 3587 a, jov. 3587 a, ♂ 3587 a, jov. 3587 a, Las Rosas ♀?, La Plata ♂ 123 a, ♂ 9560).

*Distribución.* — Norte y Este del territorio, desde Buenos Aires, E. de Córdoba hasta las provincias norteañas.