
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Una nueva subespecie de Pecho colorado *Pezites militaris* *catamarcanus*, subsp. nov Zotta, A. R. 1937

Cita: Zotta, A. R. (1937) Una nueva subespecie de Pecho colorado *Pezites militaris catamarcanus*, subsp. nov. *Hornero* 006 (03) : 449-454

Hellmayr como Dabbene al rectificar la cita de Arribáizaga incurren en un nuevo error al establecer la sinonimia, por cuanto los caracteres que asigna Arribáizaga a su ejemplar no pueden corresponder de ninguna forma a *T. r. rufiventris*. En primer lugar este autor dice que se trata de un ejemplar joven, y es sabido que los jóvenes de *T. r. rufiventris* apenas se diferencian de los adultos por ciertas máculas de los costados del cuerpo, por lo demás es exactamente igual.

Todos los caracteres que se señalaron a ese ejemplar hallado en Baradero concuerdan con los jóvenes de *T. amaurochalinus*, el cual difiere totalmente del adulto. He cazado en Zelaya, en el mes de febrero de 1931, un ejemplar hembra joven, que corresponde en toda su tonalidad al ejemplar de Arribáizaga.

UNA NUEVA SUBESPECIE DE PECHO COLORADO

Pezites (*) *militaris catamarcanus*, subsp. nov.

Por ANGEL R. ZOTTA

ENCARGADO DE LAS COLECCIONES ORNITOLÓGICAS
DEL MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES, BUENOS AIRES

Caracteres. — Similar a *Pezites militaris militaris* (L.), pero bien distinto por tener el dorso, cobijas externas del ala, y en especial los flancos, pardo ceniciento; área negra ventral, mucho menos intensa.

Descripción. — Parte superior de la cabeza, nuca y dorso, pardo ceniciento, cada pluma, con la porción mediana negra, menos intensa y los bordes claros, muy extendidos; por sobre la rabadilla y supracaudales, aún más lavado, y las estrías menos definidas, siendo en general de color casi uniforme.

Cobijas alares y rémiges, con el borde externo blanquizco, más ancho y las estrías transversales de las primeras, más destacada, a pesar de ser el fondo menos obscuro; igual carácter pero, mejor definidas las estrías, ofrecen las rectrices y subcaudales.

Garganta, pecho y porción superior del abdomen, rojizo intenso, pero

(*) El cambio en la denominación genérica para este grupo de los «Pecho colorados», está consignado en ZIMMER (1930), en la cual el autor dice: «*Trupialis* BONAPARTE 1850, no puede ser usado para estos pájaros, por la razón de haber sido antes empleado en otro sentido por MERREM 1826, como nuevo nombre para *Oriolus* ILLIGER 1811, no *Oriolus* LINNÉ; siendo entonces *Pezites* CABANIS 1851, el nombre más antiguo y válido para este grupo». Este cambio ha sido aceptado por HELLMAYR (1932) y CHAPMAN (1934).

con un ligero tono superficial claro; área ventral, castaño negruzco y con el borde apical de cada pluma, blanco.

Plumas auriculares y lados del cuello, negros, pero muy sobresalientes por el contraste, líneas superciliares, claramente más anchas, igual que la línea mediana de la corona; flancos, pardo ceniciento muy destacados e interrumpidos por una serie de líneas, indistintamente oscuras y estrechas.

Dimensiones (mm): Culmen 32, tarso 34, ala 129, cola 108.

Tipo: Museo Argentino de Ciencias Naturales, n° 8633 macho ad., de Corral Quemado, Prov. de Catamarca, Argentina. Colectado en Octubre 6 de 1913 por Juan Mogensen.

Material examinado. — 2 machos ad. y 3 hembras ad., todos de Catamarca; Corral Quemado ♂, ♀ (Mogensen, enero 1913); San José ♀ (Mogensen, diciembre 1918); Catamarca ♂, ♀ (Gemignani, enero 1905).

Observaciones. — Las hembras de esta subespecie, son aún mucho más pálidas que los machos, particularmente los flancos, que tienden al grisáceo blanquecino; también en la porción superior del pecho, la coloración rojiza, se encuentra claramente interrumpida por un espeso tinte blanco acanelado; las dimensiones son algo menores, en especial las alas y la cola, que oscilan entre 120-116 y 97-95 respectivamente, mientras en los machos: 131-129 y 108-100 (mm).

Comparando estos ejemplares con una serie de sesenta pieles de *P. m. militaris*, no hay duda que las diferencias cromáticas, los separan claramente, pero no así sus medidas, pues mientras en los ejemplares de Catamarca, estas permanecen constantes, en la forma típica, su variación es grande, como puede observarse en el cuadro adjunto.


Cuadro de medidas

Ejemplares	Culmen	Tarso	Ala	Cola
<i>P. militaris militaris</i> - Machos Argentina				
1 Santa Cruz - Aguada Grande, may. 1916	32.5	35	131	104
1 Chubut - Golfo Nuevo, oct. 1916	32.5	34	123.5	106
1 Chubut - Valle del Río, feb. 1913	31.5	37	125	111
1 Chubut - Leleque, abr. 1913 . .	32.5	36.5	127	108
1 Neuquén-Nahuel Huapí, nov. 1912	30.5	35	119	105
3 La Pampa - Calefú, ago. 1928 . .	30-30.5-31.5	35-35.5-36	117-119-119	98-104-109
2 La Pampa - Conhelo, dic. 1931 .	32.5-30.5	35-34.5	119-120	103-107
1 San Luis - Chischaca, dic. 1925	34	35	123	101
2 Mendoza - San Rafael.	31-35	35-35.5	120-122	108-95
1 Jujuy	35	36	131	112

Cuadro de medidas

Ejemplares	Culmen	Tarso	Ala	Cola
5 Córdoba, nov. 1916.	30-30.5-32	35-34-35	118-119-116	100-97-97
	29-32	34-34	124-121	100-101.5
1 Córdoba - Valle Reartes, abr. 1917	33	34	120	102
9 Buenos Aires - S. Ventana, jul. 1929	32.5 34.5-31.5	33-37 35	120 120 115	108-103 115
	32-32.5 31.5	33-34-36	120-120-121	106-108-109
	30.5-31-31.5	35-35-35	115-120-120	100-101-108
2 Buenos Aires - San Blas, abr. 1932	31.5-30	35-34	116-113	105-98
2 Buenos Aires - Rosas, abr. 1933 .	29.5-30.5	34-35.5	120-115	100-100
<i>P. militaris militaris</i> - Machos				
Chile				
3 Santiago - jun. 1914	35-32.5-32.5	35-34-34	120-118-118	108-109-109
1 Valdivia, jul. 1924	39	35.5	121	105
1 Angol, jun. 1924	34	34	110	96
1 Concepción	35	35.5	122	104
1 Aconcagua.	32.5	36.5	116	95
<i>P. militaris catamarcanus</i> - Machos				
1 Catamarca - Corral Quemado, oct. 1913	32	34	129	108
1 Catamarca, ene. 1905.	32	35	131	100
<i>P. militaris militaris</i> - Hembras				
Argentina				
1 Tierra del Fuego, ago. 1916	32	34	124	102
1 Chubut - P. Burro, abr. 1918	30.5	33	112	97
1 Chubut - Valle del Río, feb. 1913	29	34.5	117	96
3 Neuquén - N. Huapí, ene. 1913	30.5-29-29	34.5-35-35	116-120-121	95-93-100
1 La Pampa - Calefú, jul. 1928	29	32	108.5	93
4 Córdoba, sep. 1916.	28.5-27.5	33-32	107-109	90-87
	28-27	31.5-32	108-110	87.5-89
2 Buenos Aires-S. Ventana, jul. 1929	29-29	33-32	107-111	93-94.5
1 Buenos Aires - Bah. S. Blas.	26	33	105	89
<i>P. militaris militaris</i> - Hembras				
Chile				
2 Santiago, may. 1924	30-33	34-35.5	110-115	97-104
<i>P. militaris catamarcanus</i> - Hembras				
1 Catamarca - C. Quemado, oct. 1913	32	36.5	120	97
1 Catamarca - San José, dic. 1918	?	37.5	116	95
1 Catamarca, ene. 1905.	31	35	118	95

A pesar de esto, varias formas se consideran teniendo en cuenta los caracteres cuantitativos, siendo el índice fundamental, la longitud del pico.



Pezites militaris catamaicanus, vista lateral y dorsal; en cada foto, arriba macho, abajo hembra (Reducida a un poco menos de la mitad).

Una de ellas, *P. falklandicus* ⁽¹⁾, se caracteriza por sus grandes dimensiones, las medidas señaladas para el tipo tomadas en mm, son: ala 132, cola ? culmen 38, tarso 40, similares a las observadas por Wetmore, ⁽²⁾ en especímenes de esta forma insular; pero un ejemplar de Valdivia (Chile),

(1) LEVERKÜHN, *Journ. für Ornith.*, Vol. 37, 1889, p. 108.

(2) WETMORE, *Bull. U.S. Nat. Mus.*, Vol. 133, 1926, p. 373.

tiene 39 mm de culmen, marcando por ahora el record de longitud para estos grupos de pájaros.

Inversamente, Filippi distingue, por sus medidas menores, a los ejemplares del oeste de la América Tropical, con el nombre de *Sturnella bellucosa*, (1) y que debe ser referida al género *Pezites*. La longitud del pico, según Hellmayr (2), oscila, en los ejemplares del norte de Chile, entre 24-23 mm en las hembras y 26 en los machos; en cambio Zimmer (3) señala para los machos medidas aún mayores, en ejemplares de Perú (29 mm). Entre estas medidas, como puede colegirse, se encuentran varios especímenes de la Argentina, a los cuales es imposible aplicarle esta denominación.

Cabanis describe una especie del sudeste del Brasil con el nombre de *Pezites brevirostris*, (4) cuyos caracteres coinciden con *P. bellicosus*; el autor lo compara con el *Sturnus loyca* de Molina, (5) y eventualmente con *militaris*, dado que es imposible establecer alguna diferencia, entre el material chileno y argentino; además, algunos caracteres que señala Cabanis, concuerdan con el de algunos especímenes de *militaris* que no han alcanzado el completo desarrollo. El material de que se ha dispuesto para estas observaciones permite asegurar que los límites de variabilidad para la especie son muy dilatados, siendo en general los ejemplares de Córdoba, los más oscuros y de dimensiones menores; el pico es corto y alargado, en unos afilado y en otros, por el contrario, romo; los de Buenos Aires son más grandes y de color más grisáceo, y los de Patagonia, y región andina que son los más desarrollados, presentan una coloración intermedia.

También suele observarse en algunos ejemplares, aunque ocasionalmente, ciertas variaciones individuales; como ser, veladuras blanquecinas parciales o totales por todo el cuerpo, pero esto nada tiene que ver con la coloración pálida a que nos hemos referido en el material de Catamarca.

Las especies y subespecies que podrían considerarse para este género, se han reunido en la siguiente clave, en la cual se da también la distribución geográfica:

(1) FILIPPI, *Mus. Mediol. Ani. Vert. Aves*, 1847, pp. 15, 32.

(2) HELLMAYR, *Field Mus. Nat. Hist. Zool. Series*, Publ. 308, Vol. 19, 1932, p. 105.

(3) ZIMMER, *Field Mus. Nat. Hist. Zool. Series*, Publ. 282, Vol. 17, 1930, pp. 434, 435.

(4) CABANIS, *Mus. Hien.*, Vol. 1, 1851, p. 191.

(5) MOLINA, *Sagg. Stor. Nat. Chili*, 1782, pp. 254, 345.

- A) - Cobijas subalares blancas.
- B) - Coloración general grisáceo negruzco.
- C) - Longitud del culmen medido desde la base, menor de 28 milímetros.
Pezites militaris bellicosus (Filippi).
 (S. Ecuador, W. Perú, N. Chile).
- CC) - Longitud del culmen medido desde la base, mayor de 28 milímetros.
- D) - Pico grueso y robusto, en general mayor de 35 milímetros.
Pezites militaris falklandicus (Leverkühn).
 (Argentina, Islas Malvinas).
- DD) - Pico no muy grueso ni robusto, en general menor de 35 milímetros.
Pezites militaris militaris (Linné).
 Chile, Argentina, en todo el territorio excepto
 Catamarca y la Rioja).
- BB) - Coloración general grisáceo pálido.
Pezites militaris catamarcanus subsp. nov.
 (Argentina, Catamarca).
- AA) - Cobijas subalares negras.
Pezites defilippii (Bonaparte).
 (S. Brasil, Uruguay, NE. Argentina, hasta Tucumán, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires).

Después de escrita esta nota, nos llega la Parte 10 del « Catalogue of Birds of the Americas » del Dr. Hellmayr, en el cual se refiere a los Ictéridos. Por lo que respecta a este punto, el autor, que ha examinado un ejemplar de San José (Catamarca), lo considera como *P. m. militaris* (Linné). No pudiendo dudar de la determinación hecha por una autoridad en ornitología americana como Hellmayr, tendríamos que admitir, o bien, que en Catamarca existe la forma típica (la que como hemos dicho no está representada en nuestras colecciones), o que tratándose de un sólo ejemplar examinado, el autor lo haya considerado como un simple caso de variación individual, — la cual, como ya lo hemos mencionado más arriba y como lo confirma Hellmayr, — es efectivamente muy grande en esta especie. Por otra parte, hemos tenido la satisfacción de comprobar que muchas de las observaciones contenidas en este artículo, coinciden con las formuladas por Hellmayr, en el trabajo que comentamos.