
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Una nueva subespecie de cachirla
para nuestra avifauna. *Anthus
hellmayri brasilianus* Hellmayr
Pereyra, J. A.
1940

Cita: Pereyra, J. A. (1940) Una nueva subespecie de cachirla para nuestra
avifauna. *Anthus hellmayri brasilianus* Hellmayr . *Hornero* 007 (03) : 396-397

UNA NUEVA SUBESPECIE DE CACHIRLA PARA NUESTRA AVIFAUNA

Anthus hellmayri brasilianus Hellmayr

Por JOSE A. PEREYRA

En mi trabajo « Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires » ya había mencionado esta especie por un ejemplar cazado en Zelaya (B. A.) en julio de 1924, y que clasifiqué de acuerdo al trabajo del Dr. Hellmayr, publicado en esta revista en el Vol. II, pág. 190, como *Anthus hellmayri brasilianus*.

Con anterioridad remití al Museo Argentino de Ciencias Naturales dos ejemplares de esa misma localidad, que revistan en sus colecciones con los números 3009 a y 3384 a, existiendo en las mismas, otro ejemplar de Chascomús, N° 4157 a, cazado por el señor Juan B. Daguerre.

Como en septiembre de 1939 he vuelto a obtener otro ejemplar macho en Zelaya, lo que confirma la existencia de esa subespecie en la zona, y siendo nueva para nuestra avifauna, haré su descripción.

Es por arriba, desde la cabeza hasta las supra caudales, de un color pardo leonado con todo el centro de las plumas en algunas y en otras toda la barba externa, de un color castaño, siendo estas máculas más oscuras, casi negras, sobre la cabeza y cuello, dándole un bonito efecto como jaspeado; las primarias y secundarias, como también las rectrices centrales, son de color castaño ribeteadas finamente de un gris esfumado; las cubiertas alares pardo leonado con la mancha a lo largo del mástil de las plumas castaño, y las cubiertas más largas e inferiores ribeteadas más hacia el ápice de un gris esfumado; las tres rectrices medianas de cada lado, castañas con fino filete gris esfumado en su borde externo; la rectriz siguiente o subexterna es del color de las otras, pero lleva marcado en la extremidad una mancha que continúa en forma de cuña, siguiendo luego hasta la base como fino filete de un color gris esfumado; la última rectriz externa es casi toda gris esfumado, llevando en la barba interna y desde la mitad hacia la base, una mancha en forma de cuña ensanchándose hacia arriba y de color más oscuro.

Las partes inferiores del cuerpo son de un leonado pálido, más fuerte en la base del cuello y pecho, presentando algunas máculas alargadas castañas en lo superior del pecho y otras ralas sobre los flancos.

El pico con la maxila superior color cuerno y el inferior más claro como lo son las patas; la uña del dedo posterior es mucho más larga que en *A. furcatus* y menos que en *A. correndera*.

Una particularidad que he notado en esta especie y que no la he observado en ninguna otra, es la de posarse sobre hilos telegráficos y su canto, que en ese lugar emitía, era también distinto al de otros congéneres, por lo que me llamó la atención para cazarla.

Esta nueva subespecie para nuestra avifauna fué señalada por Hellmayr sólo para el Brasil, hasta Río Grande.

NOMBRES VULGARES DE ALGUNAS AVES DE ENTRE RIOS

Por M. A. FREIBERG (1)

He creído, de acuerdo con una amable sugestión del señor Director del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires, Prof. Martín Doello Jurado, durante su visita a Paraná, que podría ser de interés para los miembros de la Sociedad Ornitológica del Plata, la publicación de los nombres vulgares con que se conocen algunas aves en la provincia de Entre Ríos, como una modesta contribución al conocimiento de la nomenclatura popular de nuestra avifauna.

Dejo registrados en esta enumeración, nombres no señalados hasta ahora en unos casos, y en otros, denominaciones que en otras zonas del país no se aplican a las mismas especies que en ésta.

La nómina comprende únicamente las aves comunes más conocidas en general, con los nombres indicados, y es verosímil suponer que pueda haber algunas diferencias principalmente en las comarcas limítrofes con otras provincias.

En la parte sistemática y nomenclatura científica de este trabajo me he basado principalmente en la importante « Lista Sistemática de las Aves Argentinas » elaborada por la Sección Ornitológica del Museo Argentino de Ciencias Naturales que publica la Sociedad Ornitológica del Plata en EL HORNERO.

(1) Jefe del Departamento de Zoología en el Museo de Entre Ríos.