
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Lista sistemática de las aves argentinas Zotta, A. R. 1941

Cita: Zotta, A. R. (1941) Lista sistemática de las aves argentinas. *Hornero* 008 (01) : 137-153

LISTA SISTEMÁTICA DE LAS AVES ARGENTINAS

Comprende la enumeración de todas las especies y subespecies conocidas en la Argentina, ordenadas taxonómicamente según la moderna nomenclatura ornitológica, con sus nombres técnicos y vulgares y su distribución geográfica

ELABORADA POR LA SECCION ORNITOLOGICA DEL MUSEO ARGENTINO
DE CIENCIAS NATURALES - BUENOS AIRES

Familia Fringillidae

Subfamilia Richmondeninae

504. SALTATOR Vieillot, 1816

- * 961. *Saltator similis similis* Lafresnaye et d'Orbigny. Pico de fierro.

Saltator similis Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837. p. 36. Argentina (Corrientes).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 380.

Distribución. — E. Brasil (Bahía hasta São Paulo y Matto Grosso), Paraguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fé, Corrientes y Entre Ríos).

- * 962. *Saltator coerulescens coerulescens* Vieillot Picogueso.

Saltator coerulescens Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 105. Paraguay.

Saltator coerulescens coerulescens, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires Vol. 18, 1910, p. 381.

Distribución. — SE. Bolivia, SE. Brasil, Paraguay, Argentina (desde Jujuy, Formosa hasta Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, Corrientes).

963. *Saltator maxillosus* Cabanis Habia-tihvihtá.

Saltator maxillosus Cabanis, Mus. Hein., Vol. 1, 1851, p. 142. Uruguay (Montevideo), error = S. Brasil; según Berlepsch, 1912, São Paulo, y según Hellmayr (Santo Angelo, Río Grande do Sul).

Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 356.

Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), E. Paraguay, Argentina (Misiones).

- * 964. *Saltator aurantiostris aurantiostris* Vieillot Pepitero.
Saltator aurantiostris Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 103. Paraguay.
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 381.
 Distribución. — S. Brasil (Matto Grosso, Río Grande do Sul), SE. Bolivia (Tarija), Paraguay, Uruguay, Argentina (Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Tucumán, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).
- * 965. *Saltator aurantiostris nasica* Wetmore et Peters Pepitero.
Saltator aurantiostris nasica Wetmore et Peters, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 35, 1922, p. 45. Argentina (Mendoza, Potrerillos).
Saltator aurantiostris (no de Vieillot), Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 381.
 Distribución. — Argentina (La Rioja, hasta Mendoza, San Luis, W. de La Pampa).
- * 966. *Saltator aurantiostris tilcarae* Chapman Viracocha.
Saltator aurantiostris tilcarae Chapman, Amer. Mus. Novit., Vol. 261, 1927, pp. 2, 15. Argentina (Jujuy, Tilcara).
Saltator aurantiostris (no de Vieillot) Bruch, Rev. Mus. La Plata, Vol. II, 1904, p. 257.
 Distribución. — Argentina (Jujuy, Salta, Catamarca¹).

505. PITYLUS Cuvier, 1829

- * 967. *Pitylus fuliginosus* (Daudin) Pico pimenta.
Loxia fuliginosa Daudin, Traité Elém. Orn., Vol. 2, 1800, p. 372. « En América », según Berlepsch, 1912, Brasil (Río de Janeiro).
Pitylus fuliginosus Dabbene (ex Bertoni), Physis, Vol. 1, 1914, p. 356, Misiones (Iguazú).
 Distribución. — SE. Brasil (Bahía hasta Río Grande do Sul), E. Paraguay, Argentina (Misiones, Iguazú²).

506. GUBERNATRIX Lesson, 1837

- * 968. *Gubernatrix cristata* (Vieillot) Cardenal amarillo
Coccothraustes cristata Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 13, 1817, p. 421. Argentina (Corrientes).
Gubernatrix cristata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 401.
 Distribución. — S. Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Tucumán, Córdoba, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis, La Pampa, N. de Río Negro).

507. PAROARIA Bonaparte, 1831

- * 969. *Paroaria coronata* (Miller) Cardenal.
Loxia coronata Miller, Var. Subj. Nat. Hist., Part. 1, 1776, pl. 2. Localidad típica, no indicada.
Paroaria cristata, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 246.

(¹) Según un ejemplar de las colecciones del Mus. Argentino de C. Nat., N° 9423.

(²) En las colecciones del Mus Argentino de C. Nat., se encuentran cinco pieles de esa localidad.

Distribución. — E. Bolivia, SE. Brasil (Matto Grosso, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta, Formosa, Misiones, hasta Mendoza, La Pampa, Buenos Aires).

* 970. *Paroaria capitata* (Lafresnaye et d'Orbigny) Cardenal sin copete, Capitá.

Tachyphonus capitatus Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 29. Argentina (Corrientes).

Paroaria capitata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 400.

Distribución. — SE. Brasil (Matto Grosso), Paraguay, Argentina (Salta, Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Bs. Aires).

508. *PHEUCTICUS* Reichenbach, 1850

* 971. *Pheucticus aureo-ventris aureo-ventris* (Lafresnaye et d'Orbigny)

Rey del bosque.

Pitylus aureo-ventris Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 84. Bolivia (Yungas, Sicasica).

Pheucticus aureiventris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 378.

Distribución. — Bolivia, SE. Brasil, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba, ocasionalmente en Entre Ríos).

509. *CYANOCOMPSA* Cabanis, 1861

* 972. *Cyanocompsa cyanea sterea* Oberholser

Celestino.

Cyanocompsa sterea Oberholser, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 14, 1901, p. 188. Paraguay (Sapucay).

Cyanocompsa cyanea Bertoni, An. Soc. Cient. Argent., Vol. 75, 1913, p. 99.

Distribución. — SE. Brasil (Goyaz, Minas Geraes hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones, Corrientes).

* 973. *Cyanocompsa cyanea argentina* (Sharpe)

Reina mora.

Guiraca argentina Sharpe, Cat. Bds. Brit. Mus., Vol. 12, 1888, p. 73. Argentina (Catamarca, Fuerte de Andalgalá).

Cyanocompsa cyanea subsp. *argentina* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 379.

Distribución. — SE. Bolivia (Cochabamba hasta Tarija), Brasil (Matto Grosso), Argentina (Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Santa Fé, San Luis, Sgo. del Estero).

510. *CYANOLOXIA* Bonaparte, 1850

* 974. *Cyanoloxia glauco-caerulea* (Lafresnaye et d'Orbigny)

Azulejo.

Pyrrhula glauco-caerulea Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 85. Uruguay (Maldonado).

Cyanoloxia glaucocaerulea, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 244.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso y Bahía hasta Río Grande do Sul), Uruguay, Paraguay, Argentina (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Tucumán?).

Subfamilia **Carduelinae**511. **SPOROPHILA** Cabanis, 1844

- * 975. **Sporophila frontalis** (Verreaux) Güirá-yurú, Tuf.
Callirhynchus frontalis Verreaux, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., Vol. 5, Bull., 1869, p. 15, pl. 1, fig. 1. Cayena = error.
Sporophila superciliaris, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 355.
 Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), E. Paraguay, Argentina (Misiones).
976. **Sporophila plumbea plumbea** (Wied) Patativa.
Fringilla plumbea Wied, Beitr. Naturg. Bras., Vol. 3, 1830, p. 579. Brasil (Bahía, Minas Geraës).
Sporophila plumbea, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 355.
 Distribución. — E. Brasil (Piauhy, hasta Matto Grosso y Paraná), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones, Buenos Aires).
- * 977. **Sporophila leucoptera leucoptera** (Vieillot) Llorón.
Coccothraustes leucoptera Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 13, 1817, p. 521. Paraguay.
Sporophila leucoptera, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 355.
 Distribución. — Brasil (Matto Grosso, Goyaz, Minas Geraës), Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco, Santa Fé).
978. **Sporophila obscura obscura** (Lafresnaye et d'Orbigny) Semillero.
Emberiza obscura Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 81. Bolivia (Chiquitos).
Sporophila obscura, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 383.
 Distribución. — W. Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina (Salta, Tucumán, Buenos Aires).
- * 979. **Sporophila collaris melanocephala** (Vieillot) Dominó.
Coccothraustes melanocephala Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 13, 1817, p. 542. Paraguay.
Sporophila melanocephala melanocephala, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 384, 436.
 Distribución. — Brasil (Matto Grosso), Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco, Tucumán, La Rioja, Santa Fé, Corrientes, N. Buenos Aires).
- * 980. **Sporophila caerulescens caerulescens** (Vieillot) Corbatita.
Pyrhula caerulescens Vieillot, Tabl. Enc. Méth., Orn., livr 93, 1817, p. 1023. Brasil (en la vecindad de Río de Janeiro).
Sporophila caerulescens caerulescens, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 244.
 Distribución. — Brasil (Minas Geraës, Río de Janeiro hasta el S. de Matto Grosso y Río Grande do Sul), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Mendoza, La Pampa, Buenos Aires).

* 981. *Sporophila lineola* (Linné) Bigote.

Loxia lineola Linné, Syst. Nat., ed. 10, Vol. 1, 1758, p. 174. Asia = error, Guayana Holandesa, según Berlepsch y Hartert, 1902.

Sporophila lineola, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 385.

Distribución. — Venezuela, Guayanas, Brasil, Perú, E. Bolivia, Argentina (Salta, Chaco, Tucumán, Sgo. del Estero, Santa Fé).

* 982. *Sporophila minuta hypoxantha* Cabanis Paraguayito.

Sporophila hypoxantha Cabanis, Mus. Hein., Vol. 1, 1851, p. 150. Uruguay (Montevideo = error), Paraguay (Lambaré), según Berlepsch, 1887.

Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 355.

Distribución. — SE. Brasil (Matto Grosso, São Paulo, Paraná), Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Fromosa, Chaco, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires).

* 983. *Sporophila ruficollis* Cabanis Corbatita rojiza.

Sporophila ruficollis Cabanis, Mus. Hein., Vol. 1, 1851, p. 150. Uruguay (Montevideo). Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 385.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso y Goyaz), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Tucumán, Sgo. del Estero, Chaco, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires).

* 984. *Sporophila palustris* (Barrows) Corbatita de los bañados.

Spermophila palustris Barrows, Bull. Nutt. Orn. Cl., Vol. 8, 1883, p. 92. Argentina (Entre Ríos, Concepción del Uruguay).

Sporophila palustris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 384.

Distribución. — Argentina (Entre Ríos).

* 985. *Sporophila bouvreuil pileata* (Sclater) Caboclinho.

Spermophila pileata Sclater, Proc. Zool. Soc. Lond., 1864, p. 607. Brasil (São Paulo).

Sporophila pileata, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1915, p. 533.

Distribución. — S. Brasil, E. Paraguay, Uruguay?, Argentina (Misiones).

512. CATAMENIA Bonaparte, 1850

* 986. *Catamenia analis analis* (Lafresnaye et d'Orbigny) Corbatita gris.

Linaria analis Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 83. Bolivia (Cochabamba y Sicasica).

Sporophila analis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 383.

Distribución. — Bolivia, N. Chile, Argentina (Jujuy hasta Mendoza, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires).

* 987. *Catamenia inornata inornata* (Lafresnaye) Pico grueso.

Linaria inornata Lafresnaye, Rev. Zool., Vol. 10, 1847, p. 75. Bolivia.

Sporophila inornata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 386.

Distribución. — SE. Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy, Catamarca, Mendoza, Córdoba).

513. AMAUROSPIZA Cabanis, 1861

988. *Amaurospiza moesta* (Hartlaub)

Sporophila moesta Hartlaub, Journ. Orn., Vol. 1, 1853, p. 36. Brasil.

Amaurospiza moesta, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1918, p. 97.

Distribución. — Brasil (Maranhão, São Paulo, Paraná), Argentina (Misiones).

514. ORYZOBORUS Cabanis, 1851

* 989. *Oryzoborus angolensis angolensis* (Linné) Curió, arrocero.

Loxia angolensis Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 303. Angola = error, Brasil según Hellmayr, 1906.

Oryzoborus angolensis, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 354.

Distribución. — E. Brasil (Piauí; Pernambuco, Parahiba hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul), Paraguay, E. Bolivia, Argentina (Misiones) *.

515. VOLATINIA Reichenbach, 1850

* 990. *Volatinia jacarina jacarina* (Linné) Sierra-sierra.

Tanagra jacarina Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 314. Brasil.

Volatinia jacarina jacarina, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 386.

Distribución. — Brasil, S. Perú, E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, N. Buenos Aires).

516. SPINUS Koch, 1816

* 991. *Spinus crassirostris* (Landbeck) Cabecita negra picudo.

Chrysomitris crassirostris Landbeck, Zool. Garten, Vol. 18, 1877, p. 254. Argentina (Mendoza, pasos de Uspallata y Portillo).

Spinus ictericus maguirostris, Dabbene, Physis, Vol. 4, N° 16, 1918, p. 105. Argentina (Salta, Sierra del Cajón).

Distribución. — Chile (Aconcagua), Argentina (Los Andes, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza).

* 992. *Spinus magellanicus tucumanus* Todd Cabecita negra.

Spinus magellanicus tucumanus Todd, Ann. Carnegie Mus., Vol. 17, 1926, p. 62. Argentina (Sgo. del Estero, Lavalle).

Spinus ictericus ictericus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 387.

Distribución. — Argentina (Jujuy, Los Andes, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, Sgo. del Estero, Santa Fé, en invierno ocasionalmente en Buenos Aires).

* 993. *Spinus magellanicus alleni* Ridgway Cabecita negra del Brasil.

Spinus alleni Ridgway, Auk, Vol. 16, 1899, p. 37. Brasil (Matto Grosso, Chapada).

Spinus magellanicus alleni Todd, Ann. Carnegie Mus., Vol. 17, 1926, p. 52.

* *Oryzoborus crassirostris maximiliani* Cabanis, ha sido señalado por Burmeister en Tucumán, probablemente esta cita es errónea.

Distribución. — E. Brasil (Piauhi, Bahía, Goyaz, Matto Grosso y N. São Paulo), E. Bolivia, W. Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco).

* 994. *Spinus magellanicus ictericus* (Lichtenstein) Cabecita negra.

Fringilla ictérica Lichtenstein, Verz. Doubl. Berliner Mus., 1823, p. 26. Brasil (São Paulo).

Chrysomitris barbata (no *Fringilla barbata* Molina) White, Proc. Zool. Soc. Lond., 1882, p. 600. Argentina, Misiones y Corrientes.

Distribución. — Brasil (Minas Geraes, Río de Janeiro, SE. São Paulo hasta Río Grande do Sul), E. Paraguay, Argentina (Misiones, N. Corrientes).

* 995. *Spinus magellanicus magellanicus* (Vieillot) Cabecita negra.

Fringilla magellanica Vieillot, Hist. Nat. Ois. Chant. Zone Torr., 1805, pl. 30. Estrecho de Magallanes, error = Buenos Aires según Todd, 1926.

Spinus ictericus ictericus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 387.

Distribución. — Uruguay, Argentina (S. Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires hasta Río Negro).

* 996. *Spinus atratus* (Lafresnaye et d'Orbigny) Cabecita negra serrano.

Carduelis atratus Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 83. Bolivia (La Paz).

Spinus atratus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 387.

Distribución. — S. Perú, Bolivia, N. Chile, Argentina (Los Andes, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza).

* 997. *Spinus uropygialis* (Selater) Cabecita negra chileno.

Chrysomitris uropygialis Selater, Cat. Coll. Amer. Bds., 1862, p. 125. Chile.

Spinus uropygialis Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 356.

Distribución. — Chile (Atacama hasta Colchagua), Argentina (Jujuy, Mendoza).

* 998. *Spinus barbatus* (Molina) Cabecita negra de corbata.

Fringilla barbata Molina, Saggio Stor. Nat. Chile, 1782, pp. 247, 345. Chile (Valparaíso, según Todd, 1926).

Spinus barbatus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 387

Distribución. — Chile (Atacama hasta el Estrecho de Magallanes), Argentina (Neuquén hasta Tierra del Fuego, ocasionalmente en las Islas Malvinas).

517. *SICALIS* Boie, 1828

999. *Sicalis citrina citrina* Pelzeln Jilguero brasilero.

Sycalis citrina Pelzeln, Orn. Bras., Vol. 3, 1870, pp. 232, 333. Brasil (Paraná, Jaguaíba y Marungaba; Sao Paulo, Itararé).

Orospina pratensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 389.

Distribución. — E. Brasil (Piauhi hasta Paraná), Argentina (Tucumán).

* 1000. *Sicalis uropygialis uropygialis* (Lafresnaye et d'Orbigny) Chirigüe.

Emberiza uropygialis (error tipogr.) Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av. 1, in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 75. Bolivia.

- Pseudochloris tropygialis*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 389.
Distribución. — N. Chile, S. Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy, Tucumán).
- * 1001. **Sicalis auriventris** Philippi et Landbeck Chirigüe andino.
Sycalis auriventris Philippi et Landbeck, Arch. Naturg., Vol. 30, 1864, p. 49. Chile. (cordilleras de Santiago).
Pseudochloris lutea, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 389.
Distribución. — Chile (Antofagasta hasta Colchagua), Argentina (W. de Mendoza Neuquén).
- * 1002. **Sicalis olivascens sordida** (Chapman) Jilguero del norte.
Pseudochloris olivascens sordida Chapman, Bull. Amer. Mus. N. H., Vol. 41, 1919, p. 330. Argentina (Jujuy, Tilcara).
Pseudochloris aureiventris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 389.
Pseudochloris lutea, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 389.
Distribución. — NW. Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca).
- * 1003. **Sicalis olivascens mendozae** (Sharpe) Jilguero mendocino.
Pseudochloris mendozae Sharpe, Cat. Bds. Brit. Mus., Vol. 12, 1888, p. 778. Argentina (Mendoza).
Distribución. — Argentina (W. Mendoza).
- * 1004. **Sicalis lebruni** (Oustalet) Jilguero negro.
Pseudochloris lebruni Oustalet, Miss. Sci. Cap. Horn, Vol. 6, 1891, p. 98. Argentina (Santa Cruz, Misioneros).
Pseudosicalis lebruni Peters, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. 65, 1923, p. 332.
Distribución. — Argentina (N. Santa Cruz, W. Río Negro).
- * 1005. **Sicalis flaveola pelzelni** Sclater Jilguero.
Sycalis pelzelni Sclater, Ibis, Vol. 2, 1872, p. 42. Argentina (Buenos Aires).
Sicalis flaveola, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 388.
Sicalis pelzelni, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 245.
Distribución. — S. Brasil, S. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Mendoza, La Pampa, Bs. Aires).
- * 1006. **Sicalis luteola luteiventris** (Meyen) Misto.
Fringilla luteiventris Meyen, Nov. Act. Acad. Leop.-Carol., Vol. 16, Suppl., 1834, pl. 12, fig. 3 p., 87. Perú. (Altos de Toledo).
Sicalis arvensis arvensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 388.
Distribución. — S. Brasil, S. Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Río Negro).

Subfamilia **Emberizinae**518. **DIUCA** Reichenbach, 1850

- * 1007. **Diuca diuca crassirostris** Hellmayr Diuca pico grueso.

Diuca diuca crassirostris Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., Vol. 19, 1932 p. 74. Chile (Atacama, Valle de Copiapó, Ramadilla).

Zotta, A. R., EL HORNERO, Vol. 7, 1939, pp. 252-254. Argentina (Catamarca, Tucumán).

Distribución. — Chile (S. Antofagasta hasta N. Coquimbo), Argentina (Catamarca, W. Tucumán).

- * 1008. **Diuca diuca diuca** (Molina) Diuca.

Fringilla diuca Molina, Saggio Stor. Nat. Chile, 1782, p. 249. Chile.

Diuca diuca, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 359.

Distribución. — Chile (Aconcagua hasta Llanquihué), Argentina (Mendoza hasta el N. Chubut, accidentalmente al E. de Santa Cruz).

- * 1009 **Diuca diuca minor** Bonaparte Diuca.

Diuca minor Bonaparte, Consp. Gen. Av., Vol. 1, 1850, p. 476. Argentina (Río Negro). Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 399.

Distribución. — Uruguay, Argentina (N. de Santa Cruz hasta el E. Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, emigrando en invierno hasta Tucumán, Sgo. del Estero, Santa Fé y Entre Ríos).

519. **IDIOPSAR** Cassin, 1866

- * 1010. **Idiopsar brachyurus** Cassin

Idiopsar brachyurus Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 1866, p. 414. Bolivia (La Paz).

Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, 1926, p. 390.

Distribución. — Bolivia, Argentina (Jujuy, Tucumán).

520. **PHRYGILUS** Cabanis, 1844

- * 1011. **Phrygilus patagonicus** Lowe Chingolo cordillerano.

Phrygilus gayi patagonicus Lowe, Ibis, Vol. 5, 1923, p. 515. Nuevo nombre para *Fringilla formosa* Gould, pre-ocupado. Tierra del Fuego (C. Buen Suceso).

Phrygilus atriceps patagonicus Dabbene, An. Soc. Cient. Arg., Vol. 115, 1933, p. 300.

Distribución. — Chile (Curicó hasta Tierra del Fuego), Argentina (Neuquén hasta Tierra del Fuego a lo largo de los Andes patagónicos).

- * 1012. **Phrygilus gayi caniceps** Burmeister Come sebo chico.

Phrygilus caniceps Burmeister, Journ. Orn., Vol. 8, 1860, p. 256. Argentina (Mendoza).

Phrygilus gayi gayi Dabbene, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 115, 1933, p. 183.

Ibid., *Phrygilus gayi-caniceps*, pág. 188.

Distribución. — Argentina (Catamarca y Tucumán hasta el estrecho de Magallanes a lo largo de la región andina, ocasionalmente Buenos Aires (Sierras de la Ventana).

- * 1013. **Phrygilus gayi atriceps** (Lafresnaye et d'Orbigny) Chanchito del Norte.
Emberiza atriceps Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 76. (Chile (Tacna, Tacora).
Phrygilus atriceps atriceps Dabbene, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 115, 1933, p. 192.
 Distribución. — S. Perú, Bolivia, N. Chile, Argentina (Los Andes, Jujuy, Catamarca).
- * 1014. **Phrygilus fruticeti fruticeti** (Kittlitz) Yal. Rara negra.
Fringilla fruticeti Kittlitz, Kupfert. Naturg. Vogel, Part 2, 1832, p. 18, pl. 23, fig. 1. Chile (Valparaíso).
Phrygilus fruticeti fruticeti, Dabbene, An. Soc. Cient. Arg., Vol. 115, 1933, p. 304.
 Distribución. — W. Bolivia, Chile, Argentina (Los Andes, Jujuy, Tucumán hasta el N. del río Colorado, a lo largo de la región andina).
- * 1015. **Phrygilus unicolor unicolor** (Lafresnaye et d'Orbigny) Diuca cordillerana
Emberiza unicolor Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2, p. 79. Chile (Tacna, Tacora), según Hellmayr.
Phrygilus unicolor unicolor, Dabbene, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 115, 1933, p. 313.
 Distribución. — Chile, Argentina (S. Mendoza hasta Santa Cruz).
- * 1016. **Phrygilus unicolor tucumanus** Chapman Cantor.
Phrygilus tucumanus Chapman, Amer. Mus. Novit., Vol. 160, 1925, p. 4. Argentina (Tucumán, Taff del Valle).
 Dabbene, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 115, 1933, p. 315.
 Distribución. — Bolivia, Argentina (Córdoba, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy).
- * 1017. **Phrygilus dorsalis** Cabanis Chanchito de espalda roja.
Phrygilus dorsalis. Cabanis. Journ. Orn., Vol. 31, 1883, p. 109. Argentina (Tucumán, Cerro Vayo (= Bayo).
 Dabbene, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 115, 1933, p. 317.
 Distribución. — N. Chile, Bolivia, Argentina (Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán).
- * 1018. **Phrygilus plebejus plebejus** Tschudi Frigilo plebeyo.
Phrygilus plebejus Tschudi, Arch. Naturg., Vol. 10, 1844, p. 289. Perú (probablemente Junín, según Hellmayr).
Phrygilus plebejus plebejus, Dabbene, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 115, 1933, p. 311.
 Distribución. — S. Perú, N. Chile, Bolivia, Argentina (Jujuy, Los Andes hasta Mendoza).
- * 1019. **Phrygilus alaudinus venturii** Hartert Platero.
Phrygilus alaudinus venturii. Hartert, in Hartert y Venturi, Nov. Zool., Vol. 16, 1909, p. 180. Argentina (Tucumán, Lagunita).
Corydospiza alaudina venturii Dabbene, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 115, 1933, p. 319.
 Distribución. — Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba).
- * 1020. **Phrygilus carbonarius** (Lafresnaye et d'Orbigny) Frigilo negro.
Emberiza carbonaria Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2 p. 79. Argentina (Río Negro).
Corydospiza carbonaria Dabbene, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 115, 1933, p. 322.
 Distribución. — Argentina (La Rioja, Tucumán, Córdoba, Mendoza, La Pampa. SW. Buenos Aires, Río Negro).

521. MELANODERA Bonaparte, 1850

1021. *Melanodera melanodera melanodera* (Quoy et Gaimard) Canario de las Malvinas.
Emberiza melanodera Quoy et Gaimard, in Freycinet, Voy. Uranie et Physicienne, Zool., Vol. 1, 1824, livr. 3, p. 109. Argentina (Islas Malvinas).
Melanodera melanodera melanodera, Dabbene, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 115, 1933; p. 175.
 Distribución. — Argentina (Islas Malvinas).
- * 1022. *Melanodera melanodera princetonia* (Scott) Canario de Tierra del Fuego
Phrygilus princetonianus Scott., Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 10, 1900, p. 64. Argentina (Santa Cruz, Cheike).
Melanodera melanodera princetonia, Dabbene, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 115, 1933, p. 177.
 Distribución. — Argentina (Santa Cruz, Tierra del Fuego).
- * 1023. *Melanodera xanthogramma xanthogramma* (G. R. Gray) Jilguero de Tierra del Fuego
Chlorospiza (?) *xanthogramma* C. R. Gray, in Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, 1839, Birds, p. 96, pl. 33. Argentina (E. de las Islas Malvinas y Tierra del Fuego).
Melanodera xanthogramma xanthogramma Dabbene, Anal. Soc. Cient. Arg., Vol. 115, 1933, p. 179.
 Distribución. — Argentina (Tierra del Fuego archipiélago del Cabo de Hornos, accidentalmente, Islas Malvinas).
- * 1024. *Melanodera xanthogramma barrosi* Chapman Jilguero de Magallanes
Melanodera xanthogramma barrosi Chapman, Amer. Mus. Novit., Vol. 96, 1923, p. 12. Chile (Aconcagua, Río Blanco.)
 Zotta, A. R., EL HORNERO, Vol. VII, 1940. pp. 361-363.
 Distribución. — Chile (Aconcagua al Estrecho de Magallanes), Argentina (Neuquén hasta el Estrecho de Magallanes a lo largo de los Andes patagónicos).

522. HAPLOSPIZA Cabanis, 1851

- * 1025. *Haplospiza unicolor* Cabanis Cigarra.
Haplospiza unicolor Cabanis, Mus. Hein., Vol. 1, 1851, p. 147. Brasil. (Rio Grande do Sul).
 Dabenne, Physis, Vol. 1, 1914, p. 359.
 Distribución. — SE. Brasil, Argentina (Misiones, accidentalmente en Buenos Aires).

523. LOPHOSPINGUS Cabanis, 1878

- * 1026. *Lophospingus pusillus* (Burmeister) Afrechero.
Gubernatrix pusilla Burmeister, Journ. Orn., Vol. 8, 1860, p. 254. Argentina (Tucumán).
Lophospingus pusillus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 400.
 Distribución. — S. Bolivia, W. Paraguay, Argentina (Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Córdoba).

- * 1027. **Lophospingus griseo-cristatus** (Lafresnaye et d'Orbigny) Afrechero Boliviano.

Emberiza-griseo-cristata Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, en Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 79. Bolivia (Cochabamba, Valle Grande).

Lophospingus griseo-cristatus, Zotta A. R., EL HORNERO, Vol. 7, 1940, pp. 360-361. Argentina (Salta).

Distribución. — Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), Argentina (Salta).

524. CORYPHOSPINGUS Cabanis, 1851

- * 1028. **Coryphospingus cucullatus rubescens** (Swainson) Ará-guirá, Brasita de fuego.

Tachyphonus rubescens Swainson, Quart. Journ. Sci. Litt. & Arts Roy. Inst., Vol. 20, N° 39, 1825, p. 64. Brasil (Río de Janeiro).

Coryphospingus cucullatus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 400.

Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, E. Perú, E. Bolivia, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta La Rioja, Córdoba, N. La Pampa, N. Buenos Aires),

525. ATLAPETES Wagler, 1831

1029. **Atlapetes fulviceps** (Lafresnaye et d'Orbigny) Cabeza leonada.

Emberiza fulviceps Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, pl. 2, p. 77. Bolivia (Tacora) = Totorá.

Atlapetes fulviceps, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 396.

Distribución. — Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta).

- * 1030. **Atlapetes citrinellus** (Cabanis) Verdón.

Buarremon (Atlapetes) citrinellus Cabanis, Journ. Orn., Vol. 31, 1883, pl. 1, fig. 2, p. 109. Argentina (Tucumán, cerca de San Javier y Chaquevil).

Atlapetes citrinellus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 396.

Distribución. — Argentina (Tucumán y Salta), accidentalmente Paraguay (Río Aguaraíh-guazú).

- * 1031. **Atlapetes torquatus borellii** (Salvadori) Collarcito.

Buarremon borellii Salvadori, Boll. Mus. Zool. Torino, Vol. 12, N° 292, 1897, p. 6. Argentina (Jujuy, San Lorenzo).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 395.

Distribución. — Argentina (Jujuy).

526. ARREMON Vieillot, 1816

- * 1032. **Arremon flavirostris polionotus** Bonaparte Gran Cantor cabeza negra.

Arremon polionotus Bonaparte, Consp. Gen. Av., Vol. 1, (2), 1850, p. 488. Argentina (Corrientes).

Arremon polionotus polionotus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires Vol. 18, 1910, p. 395.

Distribución. — S. Brasil (Matto Grosso, Paraná, E. Paraguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes).

- * 1033. **Arremon flavirostris d'orbignii** Selater Gran Cantor.
Arremon d'orbignii. Selater, Proc. Zool. Soc. Lond., Vol. 24, 1856, p. 81. Bolivia (Yungas).
Arremon orbignii, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol 18, 1910, p. 395.
 Distribución. — Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca).

527 MYOSPIZA Ridgway, 1898

- * 1034. **Myospiza humeralis xanthornus** (Gould) Manimbé
Ammodramus xanthornus Gould en Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, Birds, 1839, pl. 30, p. 90. Uruguay (Maldonado).
Myospiza manimbe, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 393.
 Distribución. — Paraguay, Uruguay, Brasil (Río Grande do Sul), Argentina (Misiones, Formosa, Tucumán hasta el N. del Río Negro) *.

528. AIMOPHILA Swainson, 1837

- * 1035. **Aimophila strigiceps strigiceps** (Gould) Aimofila cordobesa.
Zonotrichia strigiceps Gould, in Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, Birds, 1839, p. 92. Argentina (Santa Fé).
Aimophila whitei, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 391.
 Distribución. — Argentina (Córdoba, Santa Fé, W. Entre Ríos).
- * 1036. **Aimophila strigiceps dabbenei** (Hellmayr) Aimofila jujeña.
Zonotrichia strigiceps dabbenei Hellmayr, Verh. Orn. Ges. Bay., Vol. 11, 1912, p. 190. Argentina (Tucumán, Tapia).
Aimophila whitii Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 391.
 Distribución. — Argentina (Jujuy, Salta y Tucumán Catamarca ?, La Rioja ?).

529. ZONOTRICHIA Swainson, 1831 (1)

- * 1037. **Zonotrichia capensis pulacayensis** (Ménégaux) Chingolo grande.
Brachyospiza capensis pulacayensis Ménégaux, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, Vol. 14, N° 7, 1909, p. 341. Bolivia.
Zonotrichia capensis pulacayensis, Zotta, A. R., EL HORNERO, Vol. 6, N° 3, 1937, p. 480.
 Distribución. — S. Perú, W. Bolivia, N. Chile, Argentina (Jujuy, Salta y Catamarca).
- * 1038. **Zonotrichia capensis sanborni** Hellmayr Chingolo andino.
Zonotrichia capensis sanborni Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., Vol. 19, 1932, p. 79. Chile (Coquimbo, Valle del Toro).
 Zotta, A. R., EL HORNERO, Vol. 8, n° 1 1941, p. 104-106.
 Distribución. — Chile (Coquimbo), Argentina (San Juan).

* *Coturniculus peruanus* (no Bonaparte) Burmeister, *Coturniculus manimbe* var. *dorsalis* Ridgway, *Myospiza manimbe nigrostriata* Cherrie y *Myospiza humeralis tucumanensis* Bangs et Penard citados para la Argentina, son sinónimos de esta ssp.

(1) La revisión de este género es provisoria.

- * 1039. **Zonotrichia capensis chilensis** (Meyen) Chingolo chileno.
Fringilla chilensis Meyen, Nov. Act. Acad. Cues. Leop.-Carol., Vol. 16 1834, p. 88.
 Chile (Santiago de Chile).
Zonotrichia capensis chilensis Chapman, Ann. Mus. Nat. Hist., N. Y., Vol. 75 1910,
 p. 404.
 Distribución. — Chile (Atacama hasta las Islas Guaitecas), Argentina (Neuquén,
 Mendoza).
- * 1040. **Zonotrichia capensis chloraules** (Wetmore et Peters) Chingolo de La Pampa.
Brachyospiza capensis chloraules Wetmore et Peters, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 35,
 1922, p. 44. Argentina (Río Negro, General Roca).
Brachyospiza capensis capensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
 1910, p. 390.
 Distribución. — Argentina (Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Córdoba).
- * 1041. **Zonotrichia capensis australis** (Latham) Chingolo austral.
Fringilla australis Latham, Ind. Orn., Vol. 1, 1790 p. 466. Argentina (Tierra del
 Fuego).
Brachyospiza capensis canicapilla, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires,
 Vol. 18, 1910, p. 390.
 Distribución. — Chile (Lanquihue), Argentina (Tierra del Fuego, Santa Cruz,
 hasta Mendoza, emigrando hacia el norte hasta el S. de Bolivia).
- * 1042. **Zonotrichia capensis mellea** Wetmore. Chingolo chaqueño.
Zonotrichia capensis mellea Wetmore, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 35, 1922, p. 39.
 Paraguay (Puerto Pinasco, 8 Km. al W.).
 Distribución. — W. Paraguay, Argentina (Formosa).
- * 1043. **Zonotrichia capensis hypoleuca** (Todd) Chingolo.
Brachyospiza capensis hypoleuca Todd, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 28, 1915, p. 79.
 Argentina (Salta).
Brachyospiza capensis argentina Todd, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 33, 1920, p. 71.
 Argentina (Buenos Aires, cerca de Río Santiago).
Brachyospiza capensis capensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
 1910, p. 390.
 Distribución. — E. S. Bolivia, Uruguay, Argentina (Salta, Formosa, Chaco,
 La Rioja, Córdoba y Buenos Aires).
- * 1044. **Zonotrichia capensis subtorquata** Swainson Tico-tico.
Zonotrichia subtorquata Swainson, Nat. Hist. Class Birds, Vol. 2, 1837, p. 288 nuevo
 nombre para *Tanagra ruficollis* (no de Gmelin) Spix 1825. -Brasil (cerca de
 Río Janeiro).
Zonotrichia capensis matutina (no de Lichtenstein), Zotta, A. R., EL HORNERO, Vol. 7,
 1940, pp. 254-255. Argentina (Misiones, Bonpland y Puerto Segundo).
 Distribución. — SE. Brasil, Uruguay, Argentina (Misiones).

530. EMBERIZOIDES Temminck, 1822

- * 1045. **Emberizoides herbicola herbicola** (Vieillot) Cola aguda encuentro amarillo.
Sylvia herbicola Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 192.
 Paraguay.

Emberizoides herbicola herbicoa, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 394.

Distribución. — E. Bolivia, S. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fé, -Brasil, Entre Ríos).

531. CORYPHASPIZA G. R. Gray, 1840

- * 1046. **Coryphaspiza melanotis** (Temminck) Orejita negra.

Emberizoides melanotis Temminck, Nouv. Rec. Pl. Col., livr. 19, 1822, pl. 114, fig. 1. Paraguay y Brasil (São Paulo, Ypanemá).

Coryphospiza melanotis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vo. 18, 1910, p. 396.

Distribución. — S. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones, Chaco, Santa Fé).

532. DONACOSPIZA Cabanis, 1851

- * 1047. **Donacospiza albifrons** (Vieillot) Monterita.

Sylvia albifrons Vieillot, Nouv. Dict. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 276. Paraguay.

Coryphospiza albifrons, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910 p. 396.

Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fé, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

533. POOSPIZA Cabanis 1847

- * 1048. **Poospiza hypochondria affinis** Berlepsch Chivichío.

Poospiza hypochondriaca affinis Berlepsch, Bull. Brit. Orn. C., Vol. 16, 1906, p. 97. Argentina (Tucumán, Lara).

Poospiza hypochondria, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 391.

Distribución. — Argentina (Salta, Catamarca, Tucumán, Mendoza).

- * 1049. **Poospiza torquata pectoralis** Todd Quien te vistió de collar.

Poospiza pectoralis Todd, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 35, 1922, p. 89 Bolivia (Santa Cruz, Guanacos).

Poospiza torquata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 392.

Distribución. — Bolivia, W. Paraguay, Argentina (Salta, La Rioja, Tucumán, Mendoza, Sgo. del Estero, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa).

- * 1050. **Poospiza melanoleuca** (Lafresnaye et d'Orbigny) Chiví-chiví.

Emberiza melanoleuca Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2, p. 82. Bolivia (Chiquitos).

Poospiza melanoleuca, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 391.

Distribución. — E. Bolivia, S. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el Norte hasta La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos).

- * 1051. **Poospiza nigro-rufa nigro-rufa** (Lafresnaye et d'Orbigny). Siete vestidos

Emberiza nigro-rufa Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2, p. 81. Paraguay, Río de la Plata y Argentina (Santa Fé).

Poospiza nigro-rufa, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 245.

Distribución. — Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Santa Fé).

* 1052. *Poospiza nigro-rufa whitii* Selater Quién te vistió.

Poospiza whitii Selater, Proc. Zool. Soc. Lond., 1881, p. 43, pl. 9. Argentina (Córdoba, Cosquín).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910 p. 392.

Distribución. — Bolivia, Argentina (Salta, Tucumán, Córdoba).

* 1053. *Poospiza erythrophrys* Selater Siete vestidos.

Poospiza erythrophrys Selater, Ibis, Vol. 5, 1881, pl. 17, fig. 1, p. 599. Argentina (Catamarca, Sierra de Totoral).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 392.

Distribución. — Argentina (Salta, Tucumán, Catamarca).

* 1054. *Poospiza ornata* (Leybold) Siete vestidos chico.

Phrygilus ornatus Leybold, Journ. Orn., Vol. 13, 1865, p. 405. Argentina (Mendoza, entre Potrerillo y Melocotón).

Poospiza ornata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 392.

Distribución. — Argentina (Tucumán, La Rioja, Córdoba, Mendoza, W. La Pampa, Buenos Aires).

* 1055. *Poospiza lateralis cabanisi* Bonaparte Miente mi tío.

Poospiza cabanisi Bonaparte, Consp. Gen. Av., Vol. 1 1850, p. 473. Paraguay = erre-re, Argentina (Misiones, Bonpland) según Hellmayr,

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 392.

Distribución. — S. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires).

534. COMPSOSPIZA Berlepsch, 1893

* 1056. *Compsospiza baeri* (Oustalet) Mudito.

Buarremon baeri Oustalet, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, Vol. 10, 1904, p. 43. Argentina (Tucumán, Lagunita).

Compsospiza baeri, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 393.

Distribución. — Argentina (Tucumán),

535. SALTATRICULA Burmeister, 1861

* 1057. *Saltatricula multicolor* (Burmeister) Manchadito.

Saltator multicolor Burmeister, Journ. Orn., Vol. 8, 1860, p. 254. Argentina (Entre Ríos, Paraná).

Saltatricula multicolor, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 393.

Distribución. — SE. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Formosa, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Sgo. del Estero, Corrientes, Entre Ríos),

536. EMBERNAGRA Lesson, 1831

- * 1058. **Embernagra platensis platensis** (Gmelin) Juan Chiviro de las pajas.
Emberiza platensis Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1789, p. 886. Argentina (Buenos Aires).
Embernagra platensis poliocephala (no de Gray), Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 245.
Distribución. — S. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fé, Buenos Aires, La Pampa, N. Río Negro).
- * 1059. **Embernagra platensis olivascens** d'Orbigny Verdón.
Embernagra olivascens d'Orbigny, Voy. Amér Mérid., Ois., 1839, p. 285. Bolivia, (Sicasica y Ayupaya).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 394.
Distribución. — Bolivia, Argentina (Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba).
- * 1060. (**Embernagra platensis gossei** Chubb.)? Malverde.
Embernagra gossei Chubb, Ibis, Vol. 6, 1918, pl. 1, fig. 2, p. 9. Argentina (Mendoza, Luján).
Embernagra olivascens, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires Vol. 18, 1910, p. 394.
Distribución. — Argentina (Mendoza, San Juan *).

* Tenemos duda sobre la validez de esta ssp., a la distribución geográfica agregamos San Juan según ejemplares colectados en enero de 1940 en las localidades de Carpintería, Barriales y Media Agua de esa provincia.

FIN DE LA LISTA SISTEMATICA

En el próximo número aparecerá la addenda et corrigenda como también el índice alfabético de las especies citadas.