
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Una buena subespecie de Hornero que debe figurar en la avifauna argentina

Pereyra, J. A.
1944

Cita: Pereyra, J. A. (1944) Una buena subespecie de Hornero que debe figurar en la avifauna argentina. *Hornero* 008 (03) : 514-515

UNA BUENA SUBESPECIE DE HORNERO QUE DEBE FIGURAR EN LA AVIFAUNA ARGENTINA

POR JOSE A. PEREYRA

Furnarius rufus comersoni Pelzeln.

Sin. *Furnarius rufus badius* (Licht.) Dabbene, Cat. 1910.

Furnarius albogularis (Spix) Dabbene, Cat. 1910.

N. v. Hornero u hornerillo de Santiago del Estero.

Esta subespecie de hornero, que ya el Dr. Dabbene en su « Catálogo Sistemático de 1910 » menciona con el nombre de *Furnarius rufus badius* (Licht.), y que en la « Lista Sistemática del Museo Argentino de Ciencias Naturales » figura este nombre en la sinonimia del *Furnarius rufus paraguayae* Cherrie y Richemberger, la considero una buena subespecie que debe figurar en nuestra avifauna.

Poseo en mi colección un ejemplar macho obsequio del Sr. Alberto Prosen, quien lo obtuvo de Colonia Dora (Santiago del Estero), en junio de 1942, colectada por el Sr. Jorge Abalos, el que, comparado con ejemplares machos del *Furnarius rufus rufus* (Gm.) de Buenos Aires, y con otro del mismo sexo de la subespecie *Furnarius rufus paraguayae* Cherrie y Reichemberger, de Loreto (Misiones), cazado en el mes de noviembre, se ve que las dos son subespecies o formas geográficas distintas de la especie típica, cuyas descripciones daré para que puedan distinguirse.

La especie típica *Furnarius rufus rufus*, es la de mayor tamaño; su ala mide 104 mm; la garganta es blanca pura y todo lo inferior del cuerpo y flancos, es de un pardusco claro uniforme, con las subcaudales algo más blanquecinas; la cabeza, el dorso y cubiertas alares, de color uniforme pardo acanelado, con la frente y lo inferior de la nuca ligeramente algo más acanelado; la cola rojiza mide 82 mm.

La subespecie *Furnarius rufus paraguayae*, que es la más semejante a la anterior, difiere de ella por las partes inferiores del cuerpo hasta las subcaudales, más oscuras, sobre todo en el pecho; las partes superiores del cuerpo algo más acaneladas rojizas, con la cabeza por arriba más oscura y sin marcas de acanelado o de rojizo en la frente que ostentan las otras dos. Su ala mide 99 mm y la cola es de igual color y tamaño que la anterior especie.

La subespecie que trato, o sea el *Furnarius rufus comersoni*, difiere de las anteriores por su menor tamaño, mide su ala 93 mm. La cabeza por arriba es más oscura que en las otras, teniendo la frente, lo inferior de la nuca y costados de la cabeza, un acanelado fuerte, siendo lo demás del dorso y alas, más acanelado; el pecho y flancos, de un ligero pardo acanelado, con la garganta, el vientre y subcaudales, blanco puro; las remiges secundarias y las cubiertas alares, también más acaneladas; la cola, de un rojo canela algo más fuerte que en las otras dos variedades, y mide 78 mm.

En esa zona de Santiago del Estero no es tan común de ver como lo es la especie *Furnarius cristatus* Burmeister, hornerito de copete.

Debo dejar constancia de que el Prof. M. Doello Jurado, en su trabajo « Notas sobre nidos de horneros », publicado en el tomo I de EL HORNERO, en la pág. 278, ya hace mención de esta subespecie de la provincia de Salta.

Los ejemplares existentes en las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales que he revisado, y que están rotulados como *F. r. paraguayae*, corresponden a mi ver a esta otra subespecie cuyo habitat se extiende desde Matto Grosso (Brasil), a través del Paraguay y Sud de Bolivia, y en nuestro territorio desde Formosa, Chaco y Santiago del Estero por todo el noroeste argentino hasta Jujuy. El *F. r. paraguayae* habita desde San Paulo (Brasil), por las zonas del río Paraná hasta el territorio de Misiones; y la especie típica *F. r. rufus*, desde el oeste de Río Grande del Sud, en el Uruguay, nuestra zona mesopotámica desde Corrientes a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, hasta el norte de La Pampa.
