
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Albinismo parcial en un ejemplar de *Furnarius rufus rufus* Achával, F. 1969

Cita: Achával, F. (1969) Albinismo parcial en un ejemplar de *Furnarius rufus rufus*. *Hornero* 011 (01) : 046-047

ALBINISMO PARCIAL EN UN EJEMPLAR DE *Furnarius rufus rufus*

Por F. ACHÁVAL (1)

En una excursión realizada el 16-X-1966 al Km 47 de la ruta 8 en el Dpto. de Canelones (Uruguay), fue cazado sobre un árbol, un ejemplar macho adulto de *Furnarius rufus rufus* (Gmelin), que presentaba albinismo parcial.

En esta nota, se describe el mencionado ejemplar y se le compara con otro individuo, macho adulto, de la misma especie, con coloración normal, procedente de Abra de Zabaleta, Depto. de Lavalleja, obtenido el 5-VII-1964 por F. Achával & E. Gerzenstein. Ambos especímenes se encuentran depositados en la colección de la sección Ornitología del Depto. de Zoología Vertebrados de la Facultad de Humanidades y Ciencias registrados con los siguientes números: ejemplar con albinismo parcial: ZVC.A.687; ejemplar con coloración normal ZVC.A.560.

ZVC.A.687 DESCRIPCIÓN: Frente y corona castaño (00S-6-7°) (2) con los extremos de las plumas blanco sucio (0-19-9°); occipucio castaño (0-6-3°) con las puntas de las plumas blanco sucio (0-19-9°); cervix, dorso y rabadilla castaño (00S-5-5°) con plumas blanco sucio (00S-16-6°); cobijas superiores de la cola blanco sucio (0-18-4°) con algunas plumas castaño (00S-7-8°); cola blanco sucio (00S-18-0°) con una tectriz de cada lado de la cola castaño (00S-7-8°); alas (cobijas menores, medianas y mayores) y lados del cuerpo castaño (00S-9-4°) con la punta de las plumas blanco sucio (0-19-9°); primarias y secundarias castaño dorado (0-8-7°); lorum, región orbital, región auricular y lados del cuello castaño (0-9-4°); mentón, región gular blanca (00S-16-4°); región yugal y pecho blanco sucio (00S-17-2°) con plumas castaño dorado (00S-9-4°); abdomen, subcaudales y piernas, blancas (0-16-2°). Ver fig. 1.

ZVC.A.560 DESCRIPCIÓN: Frente corona y occipucio castaño (0-6-3°); cervix, dorso y rabadilla castaño (0-8-3°); Cobijas superiores de la cola castaño (00S-8-8°); cola castaño (00S-8-7°); alas (cobijas menores, medianas y mayores) y lados del cuerpo castaño (0-8-3°); primarias y secundarias castaño dorado (0-8-7°); lorum, región orbital, región auricular y lados del cuello castaño (0-9-4°); mentón, región gular blanco (00S-16-4°); región yugal y pecho castaño claro (0-16-5°); abdomen, cobijas inferiores de la cola castaño claro.

MEDIDAS (EN mm) DEL MATERIAL EXAMINADO

Ej.	XVC.A.	L. T.	Ala	Cola	Tarso	Culmen:	Exp. - desde la base
	687	212	103	73	34	21	26
	560	217	112,5	75,5	35,5	21	26

COMENTARIOS:

El ejemplar que presenta albinismo parcial se distingue por la presencia en la región dorsal de plumas blancas intercaladas entre las de

(1) Becario del Depto. de Zoología Vertebrados de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

(2) Villalobos-Domínguez, C. & J. Villalobos, 1947, Atlas de los colores, pp. I-XV, 38 pls.; pp. 1-76; 1-12. El Ateneo Edit. Buenos Aires.

color castaño. El ejemplar normal es allí, castaño uniforme. Ventralmente el ejemplar albino parcial se destaca por su color blanco predominante con escasas plumas en el pecho de color castaño dorado pálido, la pierna es castaño en el ejemplar normal y blanco en el albino.




FIG. 1. — Hornero con albinismo parcial ZVC. A N° 687