
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Addendas a la avifauna salteña Gunnar, H. 1969

Cita: Gunnar, H. (1969) Addendas a la avifauna salteña. *Hornero* 011 (01) : 053-056

www.digital.bl.fcen.uba.ar

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

ADDENDAS A LA AVIFAUNA SALTEÑA

Por GUNNAR HÖY

Museo de Ciencias Naturales de Salta

La lista sistemática de las Aves Argentinas, debe ser completada, pues faltan observaciones suficientes o totales, de varias partes del país. Para realmente conocer la fauna en una provincia, es necesario vivir y estudiar la materia en aquélla, durante muchos años. Una o varias excursiones no son suficientes. Se supone que únicamente en la provincia de Tucumán la fauna es bien conocida, porque ha tenido naturalistas activos que la han estudiado en su medio durante casi 100 años. Según mis propias experiencias, casi cada excursión a cualquier parte ofrece novedades. Para la provincia de Salta, llama la atención las pocas observaciones anotadas; muy a menudo, especies y formas, están citadas para Tucumán y Jujuy, pero no han sido anotadas para Salta, aunque esas aves deben estar en dicha provincia, puesto que ni en Tucumán, ni en Jujuy hay biotopos que falten en Salta.

La lista siguiente es un suplemento para la distribución de las aves del país, citando por ahora 44 formas no anotadas aún, en las distintas listas publicadas hasta la fecha, para la Provincia de Salta.

Eudromia elegans intermedia (Dabbene & Lillo).

Esta Copetona es común entre los 3.000 y 4.000 m. en la zona andina de Salta, hasta la frontera con Bolivia.

Podiceps occipitalis occipitalis, Garnot.

Aunque escasa, se encuentra anualmente en Valle Lerma, habiéndose observado una pareja con pichones grandes.

Phoenicopterus ruber chilensis, Molina.

Nidifica junto con los Flamencos andinos en el Altiplano de Salta. En septiembre las tres especies de flamencos se encuentran en las lagunas de llanuras.

Anas versicolor versicolor, Vieillot.

Nidifica en el Valle de Lerma, donde fue observada en enero de 1966 una hembra con pichones.

Anas puna, Tschudi.

Esta especie no es rara en la zona altoandina de Salta.

Anas bahamensis rubrirostris, Vieillot.

Nidifica en el Valle de Lerma, habiéndose observado hembras con pichones en febrero de 1968.

Anas georgica spinicauda, Vieillot.

Nidifica anualmente en Valle Lerma. Varias hembras con pichones fueron observadas en febrero de 1968.

Anas cyanoptera orinomus (Oberholser).

Es abundante en verano en toda la zona Andina de Salta. En invierno es el pato más abundante en Valle Lerma.

Heteronetta atricapilla (Merrem).

Se encuentra en Salta (Cabeza de Buey).

Oxyura (australis) vitatta (Philippi).

Este Pato zambullidor nidifica abundante en Salta y Jujuy, hasta los 3.500 m. de altura.

Buteo albigula, Philippi.

Una hembra joven fue cazada en Salta, en la localidad de Orán, en enero de 1969. Esta especie es nueva para la avifauna argentina. "Journal für Ornithologie" N° 3, 1969. Berlín.

Harpyhaliaetus solitarius

Un ejemplar de esta especie rara, fue cazada en junio de 1968 en la localidad de Orán, Salta.

Elanoides forficatus yetapa, (Vieillot).

Nidifica en Orán adentro, y probablemente también en Anta (Río Piedras), Salta.

Milvago chimango chimango (Vieillot).

Es un muy común habitante de Salta, nidificando hasta los 3.500 m.

Rallus sanguinolentus sanguinolentus, Swainson.

Esta especie habita en Salta, y nidifica hasta los 3.500 m.

Patagioenas maculosa albipennis (Sclater & Salvin).

Habita la cordillera de Salta en los 3.500 m. Sin ser común, no es rara.

Geotrygon frenata margaritae, Blake, Contino & Höy.

Esta "Paloma tonta" es bien conocida en Orán adentro, Salta.

Ara ararauna (Linné).

De esta especie no hay ejemplar capturado en el país. Sin embargo se encuentra en Orán adentro, donde es conocida como rara. En 1952 fue observada en un valle profundo de Río Carapari, cerca de la frontera con Bolivia. Tres parejas volaban en una manera sociable.

Crotophaga major (Gmelin).

Esta especie es habitante de Rivadavia y Anta (Río Piedras) Salta.

Speotyto cunicularia juninensis, Berlepsch & Stolzmann.

Es común en la zona altoandina de Salta.

Colibri serrirostris (Vieillot).

Es común en Valle Lerma donde nidifica.

Chrysoptilus melanolaimus melanolaimus (Malherbe).

Es el carpintero más numeroso en la zona montañosa del norte; nidifica desde Valle Lerma, 1.200 m., hasta 3.500 m.

Chrysoptilus melanolaimus nigroviridis, Grant.

Es común en todo el norte hasta el pie de los Andes. Nidos con huevos fueron observados en Anta, Salta, en 1966.

Picumnus cirrhatus thamnophiloides, Bond & Schauensee.

Es la forma selvática del carpintero enano de Salta y Jujuy, desde la frontera con Bolivia hasta sur de Valle Lerma.

Phleocryptes melanops schoenobaenus, Cabanis & Heine.

Es común en las lagunas altoandinas de Salta.

Asthenes lilloi (Oustalet).

Fue capturado en Salta, en julio de 1967, a 4.000 m. de altura.

Asthenes maculicauda (Berlepsch).

Capturado en enero de 1967, en Nevado Cachi, a 4.500 m. de altura.

Rhinocrypta lanceolata lanceolata (Geof. S. Hil.).

Es habitante de Rivadavia, Salta, donde se encontraron nidos con huevos en 1967.

Muscisaxicola frontalis (Burmeister).

Esta especie de tiránido, también ha sido capturada en Salta.

Ochthoeca leucophrys tucumana, Berlepsch.

Es habitante de la zona andina de Salta.

Hymenops perspicillata perspicillata (Gmelin).

Es habitante muy común en Salta, hasta los 3.500 m. de altura.

Cnemotriccus fuscatus bimaculatus (D'Orbigny & Lafresnaye)

Habitante de la selva de Salta (Orán) y Jujuy.

Pyrhomyias cinnamomea cinnamomea (D'Orb. & Lafr.)

Esta especie habita en Orán, Salta.

Anaeretes parulus aequatorialis Berl. & Tacz.

Capturado en Salta, en 1964, a 3.500 m. de altura.

Stigmatura budytoides inzonata, Wetm. & Petrs.

Muy común habitante de Salta.

Elaenia albiceps chilensis, Hellmayr.

Es muy común habitante de Salta y Jujuy, hasta los 3.500 m.

Elaenia strepera, Cabanis.

Común habitante de Salta.

Phaeomyias murina ignobilis, Bond & de Schauensee.

Esta especie ha sido capturada en la localidad de Aguaray, Salta.

Progne chalybea domestica (Vieillot).

En Salta y Jujuy no es rara.

Progne modesta elegans, Baird.

Común habitante de Salta, donde en 1965 se encontraron nidos con huevos.

Notiochelidon cyanoleuca cyanoleuca (Vieillot).

Capturada en Río Lavayen, Salta.

Troglodytes solstitialis auricularis Cabanis.

Abundante en los cerros de Salta.

Mimus dorsalis (D'Orb. & Lafr.)

Común habitante de la zona andina de Salta.

Catharus dryas maculatus (Sclater).

Esta especie ha sido capturada en Orán, Salta, en Junio de 1968.

Agelaius cyanopus, Vieillot.

Especie común en la zona subtropical de Salta y Jujuy.

Thlypopsis ruficeps (D'Orb. & Lafr.)

Esta especie se encuentra en la localidad de Orán, Salta.

Gubernatrix cristata (Vieillot).

Habita en la localidad de Rivadavia, Salta, donde se han encontrado nidos con huevos, en 1967.

Sporophila minuta hypoxantha, Cabanis.

Esta especie es un habitante común de Salta y Jujuy. .

Atlapetes torquatus borellii (Salvadori).

Común y numeroso habitante de los cerros de Salta, desde el sur de Valle Lerma, hasta Bolivia.

Atlapetes fulviceps (D'Orb. & Lafr.)

Común habitante de los cerros de Salta.