
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Nueva localidad geográfica para *Pachyptila desolata banksi* Achával, F. 1971

Cita: Achával, F. (1971) Nueva localidad geográfica para *Pachyptila desolata banksi*. *Hornero* 011 (02) : 125-125

NUEVA LOCALIDAD GEOGRAFICA PARA
PACHYPTILA DESOLATA BANKSI

Por FEDERICO ACHAVAL¹

En Atlántida, Dpto. de Canelones, el 12-VII-1969, la Licenciada Blanca Sierra, encontró en la costa, un ejemplar macho, muerto, de *Pachyptila desolata banksi* A. Smith 1840. Esta especie no estaba citada para nuestra fauna. Con motivo de este hallazgo se hizo una excursión a la misma zona, por el Dpto. Zool. Vert. en fecha 16-VII-1969, integrada por el Profesor Raúl Vaz-Ferreira, Blanca Sierra, Dr. Alfredo Langguth, Bachiller Alvaro Abella y el autor del presente trabajo; en ésta se encontraron 3 ejemplares de *Pachyptila desolata banksi* A. Smith y 13 ejemplares de *Pachyptila belcheri falklandica* (Mathews). Los mencionados especímenes se encontraron muertos sobre la playa en una zona de 5 kms. de costa. De los ejemplares de *Pachyptila desolata* sólo se pudieron conservar dos en piel, el colectado por Blanca Sierra, ZVC-A 722, y el colectado por nosotros ZVC-A 718. Los restantes no se pudieron conservar por su avanzado estado de descomposición; de los mismos se guardó el esqueleto.

MEDIDAS (en mm.)

EJEMPLAR ZVC-A 722; Macho; 12/7/1969 - Long. 319; Ala 195; Cola 100;

Tarso 36; Culmen exp. 30; Cul. base 39; Ancho pico 15 - Peso: 108 gr.

EJEMPLAR ZVC-A 718; Macho 16/7/1969 - Long. 307; Ala 198; Cola 100;

Tarso 35; Culmen exp. 29; Cul. base 37; Ancho pico 16 - Peso: 111 gr.

EJEMPLAR ZVC-A 774; Sexo ?; 16/7/1969 - Long. 296; Ala 189; Cola 95;

Tarso 34; Culmen exp. 28; Cul. base 41; Ancho pico 15.

EJEMPLAR ZVC-A 775; Hembra; 16/7/1969 - Long. 920; Ala 185; Cola 96;

Tarso 32; Culmen exp. 22; Cul. base 35; Ancho pico 13 - Peso: 103 gr.

El ejemplar ZVC-A 722 y 718 tienen los testículos negros y en reposo. El ovario de la hembra ZVC-A 775 también en reposo. En el otro ZVC-A 774 no se pudo determinar el sexo. De los ejemplares ZVC-A 774 y 775 se guardan exoparásitos pertenecientes al orden malófaga. Las plumas de los ejemplares estaban impregnadas de petróleo. En el estómago del ZVC-A 775 no se encontró nada de alimento.

Nombre vulgar: "petrel ballena de pico ancho", "petrel paloma", "petrel azul de pico ancho".

BIBLIOGRAFIA

- DABBENE, R.: 1923. Petreles y Albatros del Atlántico austral. El Hornero 3 (2): 1-33, 8 figs., 11 mapas.
MURPHY, R. C.: 1936. Oceanic Birds of South America. The Macmillan Company. The Amer. Mus. Nat. Hist., N. Y., I-VII-XX + 1-640, Pt. 1-38, figs. 1-61.
OLROG, C. C.: 1959. Las Aves Argentinas, una guía de campo. Univ. Nac. Tucumán, pp. 7-345, figs. 1-904.
OLROG, C. C.: 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Univ. Nac. Tucumán, pp. 1-377.
TICKELL, W. L. N.: 1962. The dove prion, *Pachyptila desolata* Gmelin. Falk. Is. Dep. Sur Sci. Rep. Nº 33, pp. 1-55, figs. 1-16, Pts. I-VIII.

¹ Ayudante interino del Dep. Zool. Vert., Facultad de Humanidades y Ciencias, Univ. de la República, Montevideo, Uruguay. Este trabajo fue presentado en la 48ª reunión de Comunicaciones de la Sociedad Zoológica del Uruguay el día 13/10/1969.