
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Lista sistemática de aves del partido de Berisso (Bs. As.). Parte II: orden Passeriformes

Klimaitis, J. F.

1977

Cita: Klimaitis, J. F. (1977) Lista sistemática de aves del partido de Berisso (Bs. As.). Parte II: orden Passeriformes. *Hornero* 011 (05) : 404-409

www.digital.bl.fcen.uba.ar

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

LISTA SISTEMÁTICA DE AVES DEL PARTIDO DE BERISSO (Bs. As.)

Por JUAN FRANCISCO KLIMAITIS

Parte II: ORDEN PASSERIFORMES

Familia Dendrocolaptidae

108. *Lepidocolaptes angustirostris*. Trepador chico. — Visto una vez en los densos montes de la Isla Paulino, trepando en espiral a un seibo y emitiendo su peculiar grito.

Familia Furnaridae

109. *Cinclodes fuscus*, Remolinera. — Migratoria de las regiones patagónicas, llega a la zona en pleno otoño, donde se la encuentra en abundancia a orillas de canteras, lagunas, bañados y lugares anegadizos.
110. *Furnarius rufus*, Hornero. — Abundante y sedentario.
111. *Limnornis curvirostris*, Ratona de los pajonales. — Común y sedentaria. Se la ve poco debido a su costumbre de vivir en lo más intrincado de los pajonales y totorales. Allí anida.
112. *Phleocryptes melanops*, Junquero. — Muy abundante en los meses de primavera y verano, donde nidifica entre los juncuales. Los huevos son de un hermoso color azul verdoso.
113. *Leptasthenura platensis*, Coludito copetón. — Escaso. Recorre montes de campos abiertos en casales o pequeños grupitos. Larga cola y característico copete erguido.
114. *Spartonoica maluroides*, Pajerito enano. — Abundante en terrenos con pajonales, serruchetas y totorales, en los que exclusivamente habita y por lo tanto es poco conocido por la gente.
115. *Schoeniophylax phryganophila*, Coludito elegante. — Común todo el año. Muy manso. Construye con palitos un nido voluminoso, a poca altura del suelo.
116. *Synallaxis frontalis*, Pijuí de frente negra. — Oído su canto y visto en los tupidos montes de la Isla Paulino. Muy parecido a su congénere *Synallaxis spixi*; posee en cambio típica frente negra. Canto diferente e inconfundible.
117. *Synallaxis spixi*, Pijuí de vientre gris. — Común y sedentario, habita los montes y pajonales de la zona ribereña.
118. *Cranioleuca sulphurifera*, Pajerito de garganta amarilla. — Común en terrenos cubiertos con pajonales y serruchetas *Eryngium*, donde casi es imposible caminar por lo denso de la vegetación. Se lo observa todo el año. No se aleja de su típico hábitat.
119. *Asthenes baeri*, Canastero de garganta castaña. — Escaso. Sólo un ejemplar capturado en montes ribereños y posteriormente un pequeño grupito hallado en un monte de campo abierto. Muy manso.
120. *Asthenes huadsoni*, Canastero grande. — Escaso. Se lo encuentra raramente en los ambientes de pastizales húmedos y pajonales. Solitario.
121. *Phacellodomus striaticollis*, Espinero. — Común y sedentario. Frecuenta la vegetación arbustiva densa de los montes ribereños, por lo que su observación no es fácil.
122. *Anumbius annumbi*, Leñatero. — Abundante y sedentario. Ave de

canto muy alegre, cuyo nido formado por numerosos palitos entrelazados es sumamente voluminoso. Suele verse en toda época del año reparando su construcción.

Familia Formicariidae

123. *Thamnophilus ruficapillus*, Batará pardo. — Común y sedentario. Ave que frecuenta arbustos densos y pajonales de montes ribereños, difícil de ver por tal motivo, aunque se escucha su triste canto a la distancia.

Familia Cotingidae

124. *Pachyramphus polychopterus*, Anambé negro. — Escaso. Solamente tres observaciones aisladas y un ejemplar capturado en diciembre de 1969. No vi en ningún caso hembras. Frecuenta montes de sauces altos. Es un buen cantor.

Familia Tyrannidae

125. *Agriornis microptera*, Gaucho común. — Muy raro. Uno solo en julio de 1970, en terrenos abiertos con pastizales. Terrícola. Migratorio del sur patagónico.
126. *Xolmis coronata*, Monjita de corona negra. — Escasa. Aparece en otoño e invierno, viéndose unos pocos individuos solitarios recorriendo montes abiertos a orillas de bañados y campos anegadizos.
127. *Xolmis irupero*, Viudita blanca. — Rara, dos o tres observaciones en época otoñal, en campos abiertos con árboles aislados. Más escasa que la anterior.
128. *Muscisaxicola macloviana*, Dormilona. — Muy rara. Un ejemplar visto en compañía de *Lessonia rufa* en la playa de Isla Paulino.
129. *Lessonia rufa*, Negrito. — Común en los meses de otoño e invierno, solitario o en grupos, en campos roturados o a orillas de lagunas, campos anegados y playas arenosas.
130. *Hymenops perspicillata*, Pico de plata. — Ejemplares aislados o en parejas casi todo el año, siendo común y nidificando en pajonales y cortaderas.
131. *Fluvicola pica*, Viudita del agua. — En primavera y verano de 1967 encontré muchos individuos y varios nidos en árboles a orillas de arroyitos cercanos al monte ribereño. En años anteriores y posteriores al mencionado, sólo hallé ejemplares aislados.
132. *Phyrocephalus rubinus*, Churrinche. — Escaso y uno de los primeros en llegar ni bien se inicia la primavera. Frecuenta campos con arbolitos bajos, en los que se le ve posado, como asimismo sobre postes de alambrados, destacándose a lo lejos su vivo color escarlata.
133. *Satrapa icterophrys*, Churrinche amarillo. — Común en distintas épocas, en bañados y arboledas cercanas a cursos de agua, hallándose también nidos.
134. *Machetornis rixosa*, Picabuey. — Abundante y sedentario. Acompañando al ganado vacuno y equino, capturando insectos que éstos levantan al caminar.
135. *Muscivora tyrannus*, Tijereta. — Abundante en temporada estival. Aparece a principios de octubre. Nidifica en lo alto de talitas y espinillos, en campos abiertos.
136. *Tyrannus melancholicus*, Benteveo real. — Escaso. Algunos ejempla-

- res aislados frecuentando partes altas de árboles en montes ribereños, durante los meses calurosos.
137. *Myiodynastes maculatus*, Benteveo o Bichofeo rayado. — A fines de enero de 1972 en la Isla Paulino, un casal con dos jóvenes que fueron descubiertos por el señor Osvaldo Tanzola. Única observación de esta especie.
 138. *Pitangus sulphuratus*, Benteveo o Bichofeo. — Muy abundante y sedentario.
 139. *Myiophobus fasciatus*, Mosqueta de corona amarilla. — Común en primavera y verano en lugares boscosos, donde instala su nido colgante en pequeñas ramitas del monte denso.
 140. *Pseudocolopteryx flaviventris*, Mosqueta amarilla. — Común y sedentaria, se la observa entre totorales y pajonales, ambiente que frecuenta exclusivamente.
 141. *Tachuris rubrigastra*, Sietecolores de laguna. — Común todo el año, aunque con mayor abundancia en los meses calurosos. Frecuenta en especial densos juncales, donde construye su nidito en forma de copa.
 142. *Serpophaga subcristata*, Piojito de vientre amarillento. — Común y sedentario. Pequeña ave que ronda constantemente arboledas en busca de insectos. Movedizo y alegre.
 143. *Serpophaga nigricans*, Piojito de los bañados. — Escaso, observado en diferentes épocas a orillas de lagunas y canteras, entre juncales y totorales.
 144. *Elaenia parvirostris*, Fio fio. — Muy abundante en primavera y verano, habiendo encontrado su nido en horquetas de talitas, molles y espinillos, a fines de octubre y principios de noviembre. Frecuenta las partes altas de los árboles, poseyendo un canto bastante melódico y agradable.
 145. *Suiriri suiriri*, Suirirí. — Visto en una sola oportunidad en montecitos de campo abierto. Canto suave y alegre.

Familia Phytotomidae

146. *Phytotoma rutila*, Cortarramas. — Ejemplares vistos esporádicamente en otoño e invierno, aislados o en casales. También observado comiendo frutos de ligustro en casas de campo.

Familia Hirundinidae

147. *Progne chalybea*, Golondrina negra. — Rara. Pocos ejemplares observados en vuelo, en primavera y verano.
148. *Progne tapera*, Golondrina arborícola. — Más común que la anterior, se la ve en pequeños grupos en primavera y verano, sobrevolando lagunas y canteras.
149. *Notiochelidon cyanoleuca*, Golondrina barranquera. — Escasa. Sólo una observación efectuada de pocos ejemplares en vuelo sobre canteras.
150. *Hirundo rustica*, Golondrina tijerita. — Migratoria del hemisferio norte. Escasa en la zona. Apenas 2 ó 3 ejemplares volando sobre campos abiertos. Típica cola puntiaguda.
151. *Tachycineta leucorroha*, Golondrina azul. — Muy abundante de setiembre a marzo. Nidifica en la región. Forma grandes bandadas que realizan vuelos acrobáticos sobre campos, lagunas y canteras, en especial en vísperas de tormenta, atrapando insectos en el aire. También se las ve durante el invierno, aunque en menor número.

Familia Troglodytidae

152. *Troglodytes aëdon*, Ratona. — Abundante y sedentaria. Nidifica en diferentes lugares, no desdenando la proximidad humana, ya sea en caños, cajas, ollas abandonadas, etc. Es también común en la ciudad.

Familia Mimidae

153. *Mimus saturninus*, Calandria. — Abundante y sedentaria. Anida con profusión y su canto es maravilloso, incluso cuando imita a otras aves.
154. *Mimus triurus*, Calandria real. — Más escasa y de menor tamaño. Observada en otoño e invierno en campos abiertos con árboles aislados.

Familia Turdidae

155. *Turdus amaurochalinus*, Zorzal blanco. — Escaso. Solitario o en pequeños grupos mezclados a veces con el zorzal rojizo. Frecuenta montes ribereños casi todo el año.
156. *Turdus rufiventris*, Zorzal rojizo. — Abundante y sedentario, habita los montes ribereños densos, donde también anida. Es un buen cantor.

Familia Sylviidae

157. *Poliophtila dumicola*, Piojito azulado. — Común y sedentaria. Cantora y movediza, frecuenta arboledas buscando insectos de rama en rama y de hoja en hoja, tras pequeños saltitos y cortos vuelos.

Familia Motacillidae

158. *Anthus correndera*, Cachirla. — Abundante la mayor parte del año, se la observa en los llanos herbosos, donde anida en una concavidad del suelo.

Familia Cyclarhidae

159. *Cyclarhis gujanensis*, Juan Chiviro. — Escaso, aunque algunos años suele ser común. Se lo ve y escucha en los meses calurosos, dentro de los altos sauzales. Es un apreciado cantor.

Familia Vireonidae

160. *Vireo olivascens*, Chivi. — En marzo de 1972 encontré un solo ejemplar en los montes de la Isla Paulino. Recorre copas de árboles altos emitiendo sus cantos.

Familia Parulidae

161. *Parula pitiayumi*, Pitiayumí. — Lo hallé varias veces en los densos montes ribereños, siempre en sus partes más altas, cantando. Es difícil su observación. Solitario.
162. *Geothlypis aequinoctialis*, Arañero. — Común aunque no abundante

en las partes bajas de las espesuras y en los montes de la ribera. Su canto es melodioso.

163. *Basileuterus culicivorus*, Arañero chico. — Escaso. Visto en dos oportunidades en los saucedales de la Isla Paulino hacia otoño de 1972.

Familia Ploceidae

164. *Passer domesticus*, Gorrión. — Abundantísimo en las ciudades y los alrededores de casas de campo, siendo escasa su presencia en los des poblados.

Familia Icteridae

165. *Molothrus bonariensis*, Renegrado. — Común y abundante casi todo el año. No construye nidos, sino que parasita a otras aves. Forma grandes bandadas.
166. *Molothrus rufo-axillaris*, Tordo de pico corto. — Observado unas pocas veces en grupos nutridos sobre terrenos arbustivos.
167. *Molothrus badius*, Músico. — Común y abundante casi todo el año. Se trasladan de un lugar a otro en gran número. Al desplazarse emiten su canto, resultando un conjunto muy bullanguero.
168. *Icterus cayanensis*, Boyerito. — Común todo el año. Recorre montes y arboledas en pequeños grupos inquietos, buscando insectos. Se alimentan de los "bichos de cesto" con suma habilidad.
169. *Agelaius thilius*, Tordo de ala amarilla. — Muy abundante y sedentario. Forma bandadas que frecuentan bañados, lagunas y esteros con densa vegetación acuática. Es el tordo más numeroso de la zona.
170. *Agelaius ruficapillus*, Congo. — Durante otoño e invierno de 1968 pude observar por vez primera grupos de esta especie, entre ellos muchos inmaduros, entre los juncales de algunas canteras. Posteriormente en 1971, una colonia de nidificación con muchos nidos en un denso totoral.
171. *Amblyramphus holosericeus*, Federal. — Sedentario y común, pero no abundante. Ave de cabeza y pechera anaranjado rojizo, posee un silbido potente que se oye a la distancia. Frecuenta juncales y pajonales de bañados y lagunas.
172. *Pseudoleistes virescens*, Pecho amarillo. — Abundante y sedentario, recorre la zona en grupos, ya sea sobre bañados, donde nidifica, o sobre arboledas y montes ribereños.
173. *Leistes militaris*, Pecho colorado. — En enero de 1969 se observó en campos abiertos gran cantidad de ejemplares de ambos sexos en arbustos y árboles bajos. Fue la única vez que se los pudo ver en la zona en gran abundancia. Cada primavera vuelve a repetirse su presencia, pero solamente de individuos aislados.

Familia Thraupidae

174. *Thraupis sayaca*, Celestino. — Escaso. Recorre arboledas altas en pequeños grupos. No obstante, no es común.
175. *Thraupis bonariensis*, Sietecolores. — Pocas apariciones en el año, en pequeños grupos de ambos sexos, recorriendo los montes en busca de frutos. Es más común durante el otoño.

Familia Fringillidae

176. *Saltator coerulescens*, Pepitero. — En mayo de 1971 se capturó un ejemplar adulto entre las arboledas de un monte de talas, pudiendo tratarse de uno escapado de jaula. Falta confirmar con otras observaciones.
177. *Paroaria coronata*, Cardenal. — Visto una sola vez. Comunicaciones de otras personas me aseguran haber contemplado ejemplares aislados en distintos lugares de la zona. De todos modos es muy escaso.
178. *Sporophila collaris*, Dominó. — Accidentalmente pueden verse grupos o casales, particularmente durante el invierno, en vuelo sobre pastizales.
179. *Sporophila caerulescens*, Corbatita. — Viene a la zona durante la época estival en grupos que recorren cardales, quintas y proximidades de casas de campo. Son apreciados cantores.
180. *Spinus magellanicus*, Cabecita negra. — Suele aparecer en bandadas más o menos numerosas que eligen los árboles altos, como eucaliptos, casuarinas, en los alrededores de casas, o cardales en el campo, para descansar de sus recorridas. Su canto es sumamente agradable y por este motivo es muy buscado por los tramperos.
181. *Sicalis flabeola*, Jilguero. — Observado casi todo el año en grupos y especialmente en casales. Nidifica en la zona, en nidos abandonados de horneros.
182. *Sicalis luteola*, Misto. — Más común que el anterior, se lo ve en bandadas numerosas recorriendo los campos casi en toda época del año. Anida entre los cardales y pastizales altos.
183. *Coryphospingus cucullatus*, Brasita de fuego. — Accidental. Un ejemplar macho capturado entre un grupo de chingolos, en unos cañaverales secos en el otoño, constituye el único hallazgo en la zona. Puede tratarse quizás de un ejemplar escapado de jaula.
184. *Myospiza humeralis*, Chingolo de tierra. — Escaso. Encontrado en campos abiertos con pastizales, sobre alambrados. Mansos.
185. *Zonotrichia capensis*, Chingolo. — Abundante y sedentario en la región.
186. *Donacospiza albifrons*, Pajerito de cabeza gris. — Se lo encuentra en cualquier época del año, pero no es abundante. Recorre en grupos los pajonales húmedos y pastizales altos.
187. *Poospiza nigro-rufa*, Bichi-bichi. — Común y sedentario, habita los montes y matorrales arbustivos, donde se le escucha cantar. Ave confiada.
188. *Embernagra platensis*, Verdón. — Común y sedentario. Habita y nidifica en los pajonales de zonas anegadizas. Ave de canto agradable, su pico posee un llamativo color anaranjado.