

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## De mi libreta de apuntes

Klimaitis, J. F.

1977

Cita: Klimaitis, J. F. (1977) De mi libreta de apuntes. *Hornero* 011 (05) : 417-417

[www.digital.bl.fcen.uba.ar](http://www.digital.bl.fcen.uba.ar)

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Buenos Aires

## DE MI LIBRETA DE APUNTES

por JUAN F. KLIMAITIS

### **Elaenia flavogaster en la provincia de Buenos Aires**

A mediados de diciembre de 1974, en una de mis habituales recorridas por la zona costera de Berisso, en un lugar denominado Isla Paulino, observé revolotear entre los matorrales húmedos y arbustos próximos a la playa, un tiránido cuya coloración y comportamiento llamaron mi atención y que posteriormente identifiqué como a la viudita o fio-fio grande, *Elaenia flavogaster*.

De cuerpo estilizado y larga cola, volaba bajo, posándose de continuo en lo alto de los matorrales, desde los cuales solía elevarse frecuentemente en un corto salto para capturar insectos, regresando de inmediato a su atalaya natural. Postura vertical semejante a la de *Elaenia parvirostris*, abundante en esa época del año.

Descripción: Región dorsal gris pardusco, con plumas nucales alargadas; cola pardo uniforme. Alas con dos franjas blanco amarillentas y angostas bandas blancuzcas en los bordes internos de las primarias. Garganta y cuello inferior y pecho gris claro. Todo el resto ventral amarillento; tapadas alares blanquecinas.

Pico corto, negro y algo grueso; ojos y patas oscuras. No escuché de este ejemplar ninguna voz o reclamo.

La presente especie tiene una amplia distribución en las regiones subtropicales de Jujuy, Salta, Tucumán, este de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y norte de Santa Fe.

### **Stercorarius skua en la provincia de Entre Ríos**

Entre los días 6 y 11 de febrero de 1975, aprovechando mis vacaciones anuales, recorrí la región ribereña del río Uruguay, en Colón, provincia de Entre Ríos.

La característica selva en galería que acompaña a ese afluente del Plata contiene una rica avifauna que se localiza en tres biotopos bien definidos: el monte propiamente dicho, compuesto de arboledas altas, la costa arenosa tapizada de sarandíes y un área de tránsito, que es la gran masa de agua en constante movimiento.

Específicamente el río Uruguay es atravesado por aves de vuelo poderoso, como ser biguás, garzas, golondrinas, martín pescadores y gaviotas, aun cuando a estas últimas no pude verlas durante el período que permanecí en dicho lugar.

Por eso llamó mi atención una del tamaño de *Larus dominicanus*, de color enteramente pardo y prominente mancha alar blanca.

Su vuelo era lento, recto y a cierta altura de la superficie del agua, siguiendo el derrotero norte-sur, a media distancia entre ambas orillas.

Debo señalar que me acompañaba el naturalista Dr. Mateo Ricardo Zelich, quien ratificó la observación e identidad de la gaviota parda *Stercorarius skua*, acotando además que era la primera vez que veía esta especie en la provincia.

Como es sabido, estas aves son marinas y realizan largas migraciones invernales hasta más allá del Brasil, tal el caso de la subespecie *S. s. chilensis*. En esta ocasión fue hallada una solitaria sobre un curso de agua dulce, en pleno verano.