

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Nota sobre la singular adaptación trófica del Chinchero Chico

*Lepidocolaptes angustirostris*

(Familia Dendrocolaptidae)

Klimaitis, J. F.

1983

Cita: Klimaitis, J. F. (1983) Nota sobre la singular adaptación trófica del Chinchero Chico *Lepidocolaptes angustirostris* (Familia Dendrocolaptidae). *Hornero* 012 (02) : 138-139

[www.digital.bl.fcen.uba.ar](http://www.digital.bl.fcen.uba.ar)

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Buenos Aires

**NOTA SOBRE LA SINGULAR ADAPTACION TROFICA DEL CHINCHERO  
CHICO *Lepidocolaptes angustirostris* (Familia Dendrocolaptidae)\***

JUAN F. KLIMAITIS \*\*

Sabido es que la multiplicidad de adaptaciones que presentan las distintas variedades de aves en su modo de procurarse alimentos en la naturaleza, responden a variaciones de carácter genérico, específico y aún aquellas de índole probablemente individual, como las presenciadas personalmente en el caso del paseriforme del que nos ocupamos en la presente nota.

Habiendo arribado en la madrugada del 4-I-1981, a la estación de Mercedes, provincia de Corrientes y debiendo efectuar una espera, el autor recorrió el largo andén, pudiendo observar el incesante revoloteo de los atajacaminos.

Atrajo nuestra atención, además, un trepador pequeño bajo el poderoso foco de un farol, que realizaba cortos vuelos o simples "saltos" en procura de capturar polillas, otros lepidópteros e insectos atraídos por el resplandor.

El 15-I-1981, en una visita al Parque Nacional El Palmar (Colón, Entre Ríos) se repitió el hallazgo del trepadorcito en cuestión, que nos llevó a seguirlo con los prismáticos, contemplando su particular movimiento en derredor de los troncos, ascendiendo a medida que picoteaba la rugosidad de la corteza. En cierto momento, voló bruscamente de su asidero para posarse lateralmente y en su parte interna, del borde de un tambor de 200 l, usado para residuos de los acampantes de este parque nacional. Así, en esta postura y por espacio de más o menos diez minutos, permaneció en este tambor, y con diestro manejo de su largo pico, engullía presuroso, las moscas que salían del recipiente.

Ni siquiera nuestra proximidad (a escasos cinco metros para fotografiarlo), lo hizo alejar de su comedero.

Haciendo una síntesis de las observaciones comentadas sobre el particular hábito o comportamiento alimentario de este dendrocoláptido, eminentemente trepador, se desprende lo sorprendente de su adaptabilidad a situaciones que en modo alguno son frecuentes en el medio natural en el que se desenvuelve, lo que le permite aumentar las posibilidades de supervivencia de la especie.

**SUMMARY:** An unfrequent feeding behavior of *Lepidocolaptes angustirostris* is described, which may probably help the species survival in rather unnatural surroding.

\* Entregado para su publicación: 2-XII-1982.

\*\* Observador de aves independiente. Dirección postal: Casilla de Correo N° 24. (1923) Berisso. Provincia de Buenos Aires. Argentina.

ISSN 0073-3407	EL HORNERO	Buenos Aires	v. XII	n. 2	pág. 138-139	diciembre 1983
-------------------	---------------	-----------------	--------	------	-----------------	-------------------



**Fig. 1:** Singular adaptación de un Chinchero Chico.