
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Nota bibliográfica (AOU: *Check-list of North American birds*)

Fraga, R. M.

1984

Cita: Fraga, R. M. (1984) Nota bibliográfica (AOU: *Check-list of North American birds*). *Hornero* 012 (03) : 158-158

www.digital.bl.fcen.uba.ar

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

TABLA 1
Pesos (en g.) de 1 pichones de *Chlorostilbon aureoventris*

DIA	0	1	4	6	7	9	10	11	13
Pichón 1	0,3	0,5	0,9	2,0	2,2	3,2	3,3	3,8	4,1
Pichón 2	0,3	0,4	0,8	1,6	1,9	3,0	3,2	3,6	3,8

NOTA BIBLIOGRAFICA

Check-list of North American Birds - Sexta Edición. Preparada por un Comité ad-hoc de la American Ornithologists' Union -1983- Precio: u\$s 35 (u\$s 28 a miembros de la A.O.U.).

La sexta edición de la lista patrón de aves de Norteamérica aparece con numerosos cambios. Entre los más sustanciales destacamos:

1) Extensión geográfica aumentada hasta incluir Centroamérica y las Antillas (con excepción de Trinidad y Tobago). Por lo tanto se incluyen ahora centenares de especies neotropicales. La extensión, con todo, implica un corte arbitrario a la unidad de la región zoogeográfica Neotropical.

2) Se excluyen las subespecies, por lo que para estas hay que recurrir a otras fuentes.

3) Se introducen muchos cambios en nomenclatura. Por ejemplo los flamencos figuran como Orden Phoenicopteriformes. Los más discutibles entre estos cambios, a juicio de este revisor serían: a) incluir Turdidae y Sylvidae en una gigantesca Familia Muscipidae. Este criterio no es novedoso con todo. b) Extender la Familia Emberizidae hasta incluir en ella Parulidae, Thraupidae e Icteridae. c) Una nueva alteración a la zarandeada Familia Fringillidae, que ahora incluye Carduelidae. d) Separar a los gorriones como Familia Passeridae.

Un punto débil en la obra es el correspondiente al hábitat que se da para cada especie. Para las especies neotropicales se sigue a Meyer de Schauensee (*A Guide to the Birds of South America*), que, como es sabido, usa una clasificación de zonas de vida que no siempre es aplicable al cono sur de Sudamérica. Así por ejemplo, a especies que en Argentina llegan hasta Río Negro o Chubut se las considera "tropicales o subtropicales" (v.g. *Pitangus sulphuratus*).

Para algunas especies se da información detallada errónea (v.g. *Paroaria capitata*), supuesto habitante de zonas semiáridas, cuando es casi ribereña.

La distribución de las especies en lo que hace a Argentina no está al día, y refleja el conocimiento que se tenía del tema unos 6 años atrás (antes de la última lista de C. Olrog en 1979).

Estas observaciones no implican negar la utilidad de la obra, la que merece figurar en bibliotecas de museos, entes conservacionistas, etc. Posiblemente los sistemáticos objetarán principalmente la no inclusión de subespecies en la lista.

Lic. Rosendo FRAGA
Enero de 1984