
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Estudio de una colección de aves de Corrientes. 1. (Dendrocolaptidae, Furnariidae)

Darrieu, C. A.; Camperi, A. R.
1990

Cita: Darrieu, C. A.; Camperi, A. R. (1990) Estudio de una colección de aves de Corrientes. 1. (Dendrocolaptidae, Furnariidae). *Hornero* 013 (02) : 138-146

ESTUDIO DE UNA COLECCION DE AVES DE CORRIENTES. 1. (DENDROCOLAPTIDAE, FURNARIIDAE)

Carlos A. Darrieu*
Aníbal R. Camperi*

RESUMEN.- Con este trabajo iniciamos una serie de notas en las cuales se realiza el tratamiento sistemático de las diferentes especies de aves que habitan en la provincia de Corrientes y que fueran obtenidas por el colector William H. Partridge entre los años 1960 y 1962. Se aportan además datos sobre peso del cuerpo, desarrollado de las gónadas y algunas anotaciones referidas a la nidificación y cría; dichas informaciones fueron registradas por el mencionado colector.

En la colección de aves de Corrientes de W.H. Partridge, se encuentran representadas ocho especies de Dendrocolaptidae y veinticinco de Furnariidae, como resultado de su estudio se especifican localidades de captura en dicha provincia para siete de ellas, previamente citadas en forma general. Con respecto a las restantes especies estudiadas, se confirma la presencia de aquellas que estaban citadas sin material de referencia y se aportan nuevas localidades para otras.

ABSTRACT.- Study of the birds collected by W.H. Partridge in Corrientes province, Argentina, 1.

In this note the authors report on a study of all the species of Dendrocolaptidae and Furnariidae collected by William H. Partridge in Corrientes, between 1960 and 1962; they are kept in his collection housed in the Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires. The former family is represented by eight species and the latter by twenty five. Exact localities for *Xiphocolaptes albicollis albicollis*, *Dendrocolaptes platyrostris platyrostris*, *Upucerthia certhioides certhioides*, *Leptasthenura platensis*, *Synallaxis albescens albescens*, *Synallaxis spixi* and *Philydor rufosuperciliatus acritus* are given. The presence of other species previously cited without voucher specimens is confirmed and new localities for others are added. Weight of the body, gonadal development, and sometimes nesting and breeding data are furnished along with the present contribution.

INTRODUCCION

Hasta el presente son escasos los estudios de conjunto sobre la avifauna de la provincia de Corrientes. Entre los que se publicaron recientemente pueden mencionarse los de Short (1971, 1975), Contreras (1979, 1980-81, 1981, 1987 a y b), Contreras y Contreras (1978, 1984), Darrieu (1984, 1986, 1987) y Darrieu y Camperi (1988).

Con este trabajo iniciamos una serie de notas en las cuales se realiza el tratamiento sistemático de las diferentes especies de aves que habitan en la provincia de Corrientes, y que fueran obtenidas por el colector William H. Partridge entre los años 1960 y 1962. Se aportan además datos sobre peso del cuerpo, desarrollo de las gónadas y algunas anotaciones referidas a la nidificación y cría; dichas informaciones fueron registradas por el mencionado colector.

En la colección de aves de Corrientes de W. H. Partridge, se encuentran representadas ocho especies de Dendrocolaptidae y veinticinco de Furnariidae, como resultado de su estudio se especifican localidades de captura en dicha provincia para *Xiphocolaptes albicollis albicollis*, *Dendrocolaptes platyrostris platyrostris*, *Upucerthia certhioides certhioides*, *Leptasthenura platensis*, *Synallaxis albescens albescens*, *Synallaxis spixi* y *Philydor rufosuperciliatus acritus*, previamente citadas en forma general para la provincia de Corrientes.

Con respecto a las restantes especies estudiadas, se confirma la presencia de aquellas que estaban citadas sin material de referencia y se aportan nuevas localidades para otras.

MATERIAL Y METODOS

El material examinado forma parte de la colección Partridge, que pertenece al Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Cuando fue necesario para el tratamiento




Figura 1: Mapa de localidades del material estudiado

1- Corrientes; 2- Santa Ana; 3- San Luis del Palmar; 4- Itatí; 5- Empedrado; 6- Manantiales; 7- Itá Ibaté; 8- Ituzaingó; 9- San Carlos; 10- Saladas; 11- Concepción; 12- Colonia Carlos Pellegrini; 13- Gobernador Virasoro; 14- Colonia Garabí; 15- Garruchos; 16- Bella Vista; 17- Cuay Grande; 18- Torrent; 19- Santa Lucía; 20- Yataity Calle; 21- Chavarría; 22- Po. López (río Corrientes y ruta 12); 23- Mercedes; 24- Alvear; 25- Tapebicú; 26- Paso de los Libres; 27- Sauce; 28- Monte Caseros.

de algunas especies, se revisaron ejemplares adicionales del Museo de La Plata (MLP).

Las medidas gonadales se expresan en milímetros y el peso corporal en gramos. Las localidades de colecta se indican en un mapa adjunto (Fig. 1).

RESULTADOS

Detallamos a continuación las especies estudiadas, correspondientes a las familias Dendrocolaptidae y Furnariidae.

DENDROCOLAPTIDAE

Sittasomus griseicapillus sylviiellus

La primera cita con localidad y material corresponde a Contreras (1983), quien menciona dos hembras procedentes de Garruchos y aporta sus pesos y mes de captura, pero omite otros datos como año de colecta y colector. Además, incluye en esta subespecie a dos machos de Yuto (Jujuy), lo cual evidentemente es un error ya que la raza que habita en el noroeste de nuestro país es la nominotípica.

Garruchos, 1 ♂ y 2 ♀, 12 y 18 May 1961; Dpto. Itatí, Ea. Tuyutí, 2 ♀, 15 y 19 Dic 1961.

Gónadas: 2 ♀, 4 x 2; 6 x 3 (Dic).

Peso: 1 ♂; 12,7.

Drymornis bridgesii

Esta especie fue citada por primera vez para Corrientes por Doering (1874), para el Río Guayquiraró, sin material colectado.

Posteriormente, el único autor que menciona localidades correntinas es Contreras (1987), sin aclarar si se trata de material colectado o un registro de observación.

Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 5 ♂ y 3 ♀, 21 y 23 Dic 1962; Mercedes, Ea. Rincón del Ombú, 1 ♂, 4 Oct 1961; Sauce, 2 ♂ y 1 ♀, 8 Feb 1960.

Gónadas: 6 ♂, 9 x 7 (Oct); 4 x 2; 5 x 3; 7 x 4; 8 x 4; 8 x 4,5 (Dic). 3 ♀, 7 x 3,5; 8 x 4; 9 x 5 (Dic).

Peso: 1 ♂, 90.

2 ♀, 87,3; 97,3.

Xiphocolaptes albicollis albicollis

La primera cita de esta subespecie para Corrientes es la de d'Orbigny y Lafresnaye (1838), sin indicar localidad.

Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 1 ♀, 11 Abr 1962.

Gónadas: 1 ♀, 4 x 2 (Abr).

Dendrocolaptes platyrostris platyrostris

Short (1975) es quien cita por primera vez a esta subespecie para la provincia de Corrientes, sin precisar localidad ni material de colecta.

Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 11 ♂ y 11 ♀, 23-30 Mar, 1-15 Abr 1962; Garruchos, 3 ♂ y 3 ♀, 11-15 May 1961; Torrent, barra del Cuay Grande, Ea. San Antonio, 2 ♀, 28 Abr y 2 May 1962.

Gónadas: 12 ♂, (2) 1 x 1; (2) 2 x 1; 2 x 2; 3 x 1; 3 x 2; 4 x 2 (Mar); 2 x 1; 4 x 3; 5 x 3 (Abr); 4 x 2 (May).

12 ♀, (2) 3 x 1; 3 x 2; 4 x 2; 5 x 3; 8 x 5 (Mar); 3 x 2; 4 x 2; (3) 5 x 2; 8 x 4 (Abr).

Peso: 3 ♂, 55,1; 59,3; 62,9.

3 ♀, 58,7; 64,5; 68,9.

Campylorhamphus trochilirostris hellmayri

La primera cita para Corrientes corresponde a d'Orbigny (1835-1844), quien la menciona para islas del Paraná, cerca de Goya.

La siguiente mención de localidad concreta es la de Short (1971), basada en un macho colectado en Itá Ibaté y en varias observaciones de campo.

Bella Vista, desembocadura del Riacho Ibirá Pitá, 1 ♂, 3 May 1980, col. C. Darrieu, MLP; Itá Ibaté, 1 ♂, 5 Nov 1967, col. L. Short, MACN.

Campylorhamphus falcularius

Sólo se conocía para Corrientes a través de la cita de Short (1971), quién si bien no analizó material, fue informado de la existencia de un ejemplar de Colonia Garabí, depositado en el MACN.

Colonia Garabí, 1 ♂, 1 Abr 1962.

Gónadas: 1 ♂, 1 x 1 (Abr).

Además de las especies mencionadas se hallan en esta colección ejemplares correspondientes a *Lepidocolaptes angustirostris angustirostris*, *Lepidocolaptes a. praedatus* y *Lepidocolaptes squamatus falcinellus*, tratadas detalladamente en trabajos anteriores por Darrieu (1985, 1986).

FURNARIIDAE

Geositta cunicularia cunicularia

Esta raza no había sido citada para Corrientes, hasta que Contreras y Höy (1980) dan a conocer cuatro ejemplares colectados por Partridge en Paso de los Libres y Tapebicuá, durante la época invernal.

Fraga y Narosky (1985) citan un nido procedente de Mercedes.

Chavarría, puente Batel, 1 ♂ y 1 ♀, 14 Oct 1961; Mercedes, Ea. Itá Pua, 5 ♂ y 1 ♀, 27 Set 1961; Mercedes, Ea. Rincón del Ombú, 15 ♂ y 10 ♀, 24-29 Set, 1-9 Oct 1961; Paso de los Libres, 1 ♂ y 2 ♀, 4 y 5 May 1961; Tapebicuá, 1 ♂, 5 May 1961.

Gónadas: 20 ♂, 1, 5 x 1; (2) 11 x 6; (2) 11 x 7; 12 x 6; 12 x 7; 12 x 8; 13 x 7; 13 x 8 (Set); 2 x 1; (3) 12 x 6; (2) 12 x 7; 13 x 6; 13 x 7; 14 x 6; 15 x 5 (Oct).

10 ♀, 3 x 1; 5 x 2; huevo para poner (Set); 3 x 1; 3 x 2; 5 x 2; 6 x 4; 10 x 5; 12 x 7; huevo para poner (Oct.).

Upucerthia certhioides certhioides

La primera cita de esta subespecie para Corrientes es la de d'Orbigny y Lafresnaye (1838), sin indicar localidad. Ménégau y Hellmayr (1906) también la mencionan para esta provincia sobre la base de un ejemplar adulto de julio de 1829, sin localidad especificada.

Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 1 ♂ y 3 ♀, 21 y 22 Dic 1962; Concepción, Ea. Rincón de Luna, 1 ♂, 4 Nov. 1961; Mercedes, Ea. Rincón del Ombú, 1 ♂, 8 Oct 1961; San Luis del Palmar, Ea. Garabatá, 9 ♂, 5 ♀ y 1 ♀, 21-29 Nov, 4-8 Dic 1961.

Gónadas: 12 ♂, 6 x 5 (Oct); 3 x 1; 3 x 2; 5 x 2; 6 x 3; (2) 6 x 4 (Nov); 5 x 3; 5,5 x 3; (2) 6 x 4; 8 x 5 (Dic.)

8 ♀, 3 x 1; (2) 8 x 3 (una en nido con dos huevos) (Nov); 2 x 1; (2) x 1; (2) 6 x 3; 7 x 3; 9 x 4 (Dic).

Peso: 3 ♀, 21,8; 24,8; 26,4.

Cinclodes fuscus fuscus

La primera cita de esta subespecie para la provincia de Corrientes es la de Nores e Yzurieta (1983) sobre la base de un individuo observado en Paso Santa Rosa, al norte de Esquina.

Alvear, Ea. Santa Ana, 1 ♀, 29 May 1962; Cuay Grande, Dest. Santa Ana, 2 ♂ y 1 ♀, 17-19 May, 6 Jun 1962; Cuay Grande, Ea. La Isabelita, 1 ♂, 21 May 1962; Torrent, barra del Cuay Grande, Ea. San Luis, 1 ♂, 11 May 1962; Torrent, Monte del Cuay Chico, 2 ♂ y 1 ♀, 31 May, 1 Jun 1962.

Gónadas: 6 ♂, 1 x 1; 2 x 1; (2) 3 x 1; 3 x 2 (May); 2 x 2 (Jun).

3 ♀, 6 x 3 (May); 4 x 2; 5 x 3 (Jun).

Furnarius rufus rufus

Comparando los ejemplares de Corrientes entre sí y a su vez con otros de distintas provincias argentinas, se advierte una enorme variabilidad intraespecífica, como lo hace notar Vaurie (1980).

Cnia. Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 2 ♂, 3 Abr 1961; Garruchos, 2 ♂ y 2 ♀, 11-13 May 1961; Dpto. Itatí, Ea. Tuyutí, 2 ♂, 18-19 Dic 1961; Ituzaingó, 1 ♀, 2 Feb 1960; Saladas, 1 ♂ y 1 ♀, 7 Feb 1960; San Carlos, río Aguapey, Ea. San Joaquín, 1 ♂, 12 Jul 1961; Dpto. San Cosme, Santa Ana, 1 ♂ y 1 ♀, 18 y 19 Dic 1960; San Luis del Palmar, arroyo Riachuelo, 1 ♀, 17 Dic 1960.

Gónadas: 4 ♂, 3 x 1; 3 x 2 (Abr); 1 x 1; 3 x 1 (Dic).

Peso: 2 ♂, 51; 55,4.

2 ♀, 54,5; 58,1.

Leptasthenura platensis

Mencionada por primera vez por Vaurie (1980) en forma general para la provincia.

Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 1 ♂, 22 Dic 1962; Mercedes, Ea. Rincón del Ombú, 5 ♀, 25 Set, 4 y 6 Oct 1961.

Gónadas: 1 ♂, 4 x 2,5 (Dic).

2 ♀, (2) 6 x 4 (Oct).

Peso: 1 ♂, 10.

Synallaxis phryganophila phryganophila

La primera cita de esta raza para Corrientes es la de d'Orbigny y Lafresnaye (1837), sin indicar localidad.

Posteriormente, Doering (1874) la cita para el Río Guayquiraró, siendo ésta la única mención hasta la fecha de una localidad concreta.

Dpto. Itatí, Ea. Tuyutí, 3 ♂, 3 ♀ y 1?, 4 Feb 1960, 14-17 Dic 1961; Mercedes, Ea. Rincón del Ombú, 1 ♀, 29 Set 1961; San Carlos, río Aguapey, Ea. San Joaquín, 1 ♂, 12 Jul 1961; Dpto. San Cosme, Santa Ana, 1 ♂ y 1 ♀, 18 Dic 1961.

Bella Vista, 2 ♂, 7 May 1980, col. C. Darrieu, MLP; Manantiales, 2 ♂ y 1 ♀, 17 Jun y 18 Ago 1947, col. T. Apóstol, MLP.

Gónadas: 2 ♂, 6 x 3; 7 x 4 (en nido con cuatro huevos) (Dic).

3 ♀, 6 x 3 (Set); 6 x 3; 13 x 5 (Dic).

Synallaxis ruficapilla

Esta especie no había sido citada para Corrientes hasta que Short (1971) dió a conocer material coleccionado por él en Colonia Garabí. Este autor menciona además, otros ejemplares adicionales pertenecientes al American Museum of Natural History, al Carnegie Museum y al Museo Argentino de Ciencias Naturales, de las localidades Colonia Garabí y Garruchos, pero no aporta peso ni estado gonadal.

Contreras (1979) da el peso de tres hembras procedentes de Paso Mbaracaya.

Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 12 ♂ y 13 ♀, 23-31 Mar, 1-18 Abr 1962; Garruchos, 4 ♂ y 2 ♀, 10-19 May 1961.

Gónadas: 12 ♂, (3) 1 x 1; (3) 1 x 1; (3) 3 x 1; 3 x 2 (Mar); 1 x 1; (2) 2 x 1; 2 x 2; 3 x 1 (Abr). 13 ♀, 1 x 1; 3 x 1; 3 x 2; 4 x 2; (2) 5 x 2 (Mar); 2 x 1; (3) 3 x 1; 4 x 1; 7 x 2; 7 x 3 (Abr).

Peso: 4 ♂, 13; 14; 14,7; 15,1.

2 ♀, 14; 15,4.

Synallaxis frontalis frontalis

La primera cita de localidades correntinas corresponde a Esteban (1953), sobre la base de material colectado en Manantiales e Isla Apipé Grande.

Con posterioridad, Contreras (1979) da el peso de una hembra procedente de Estancia Ibiratingay.

Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 3 ♂ y 1 ♀, 21-27 Dic 1962; Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 1 ♂ y 1 ♀, 31 Mar y 12 Abr 1962; Garruchos, 1 ♀, 18 May 1961; Dpto. Itatí, Ea. Tuyutí, 2 ♂ y 1 ♀, 4 Feb 1960, 18 Dic 1961; Ituzaingó, Ea. Puerto Valle, 1 ♀, 2 Nov 1962; Mercedes, Ea. Rincón del Ombú, 2 ♂ y 2 ♀, 29 y 30 Set 1961; Saladas, 1 ♂, 7 Feb 1960; San Carlos, río Aguapey, Ea. San Joaquín, 1 ♂ y 1 ♀, 12 y 13 Jul 1961; Dpto. San Cosme, Santa Ana, 2 ♂ y 1 ♀, 18 y 19 Dic 1960; San Luis del Palmar, arroyo Riachuelo, 1 ♀, 17 Dic 1960; Santa Lucía, Yataity Calle, 2 ♂, 15 y 16 Oct 1961; Torrent, barra del Cuay Grande, 2 ♂ y 3 ♀, 1 May 1962; Torrent, Monte del Cuay Chico, 1 ♂, 5 May 1962.

Bella Vista, 1 ♂, 1 ♀ y 2?, 5 y 9 May 1980, 18 Oct 1982, 12 Nov 1987, col. C. Darrieu, MLP; Manantiales, 6 ♂ y 1 ♀, 18 Dic 1946, 8 Feb. 17 Jun, 8 y 12 Jul 1947, col. T. Apóstol, MLP.

Gónadas: 11 ♂, 3 x 1 (Abr); 1 x 1; (2) 2 x 1 (May); 6 x 3; 8 x 4 (Set); 10 x 4 (Oct); 5 x 3,5; 6 x 3; (2) 7 x 4 (Dic.).

9 ♀, 1 x 1 (Mar); 2 x 1; 6 x 2; 6 x 3 (May); (2) 6 x 3 (Set); 7 x 4 (Nov); 6 x 3; nido con tres huevos (Dic).

Peso: 3 ♀, 13,3; 14,7; 15,5.

Synallaxis albescens albescens

La primera cita para Corrientes es la de Contreras (1987b) sin mencionar material ni localidad.

Alvear, Ea. Ñanderú, 1 ♂, 3 Jun 1962; Alvear, Ea. Santa Ana, 1 ♀, 4 Jun 1962; Torrent, barra del Cuay Grande, Ea. San Antonio, 1 ♂, 1 May 1962; Torrent, 1 ♀, 7 Jun 1962.

Gónadas: 2 ♂, 2 x 1 (May); 1 x 1 (Jun).

2 ♀, 3 x 1; 4 x 2 (Jun).

Synallaxis spixi

La primera cita para la provincia es la de Olrog (1979) sin material ni mención de localidad.

Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 2 ♂ y 1 ♀, 5-11 Abr 1962; Garruchos, 3 ♂, 13-19 May 1961; San Carlos, río Aguapey, Ea. San Joaquín, 1 ♂ y 2 ♀, 7-17 Jul 1961.

Gónadas: 2 ♂, 2 x 1, 2 x 2 (Abr).

1 ♀, 2 x 1 (Abr).

Peso: 3 ♂, 11,9; 12,4; 13,5.

Certhiaxis obsoleta

Dada a conocer para la provincia por Short (1971), en base a material de colección procedente de varias localidades.

Alvear, Ea. Ñanderú, 1 ♂ y 1 ♀, 28 May 1962; Alvear, Ea. Santa Ana, 1 ♀, 6 Jun 1962; Cnia. Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 6 ♂ y 9 ♀, 25-31 Mar, 2-19 Abr 1962; Cuay Grande, Ea. El Ceibo, 3 ♂ y 3 ♀, 12-16 May 1962; Garruchos, 4 ♂ y 3 ♀, 9-19 May 1961; Ituzaingó, Ea. Puerto Valle, 12 ♂ y 10 ♀, 2-25 Nov, 7 Dic 1962; San Carlos, río Aguapey, Ea. San Joaquín, 2 ♂ y 3 ♀, 7-22 Jul 1961; Torrent, barra del Cuay Grande, Ea. San Luis, 1 ♂, 11 May 1962; Torrent, Monte del Cuay Chico, 5 ♂ y 6 ♀, 4-31 May 1962.

Gónadas: 26 ♂, (2) 2 x 1; 3 x 1; 5 x 2 (Mar); 1 x 1; 3 x 1 (Abr); 0,5 x 0,5; (2) 1 x 1; (4) 2 x 1; 2 x 2; 2,5 x 1,5; 4 x 2 (May); (2) 7 x 4; 9 x 6; 10 x 5; 11 x 5; 12 x 5; 12 x 6; 12 x 6,5; 13 x 7; 14 x 6 (Nov); 9 x 5 (Dic).

30 ♀, 5 x 3; 6 x 3 (Mar); (2) 3 x 1; 4 x 2; 5 x 1; 5 x 2; 6 x 3; 8 x 3 (Abr); 3 x 1; 4 x 2,5; 5 x 3; (2) 6 x 2; (2) 6 x 3; 6 x 4; (2) 8 x 4 (May); 6 x 2,5 (Jun); 6 x 2,5; (3) 6 x 3; 7 x 3; 7 x 4; 8 x 3,5; (2) 8 x 4 (Nov); 6 x 3 (Dic.).

Peso: 18 ♂, 11; 11,6; 11,8; 11,9; (2) 12; 12,2; (2) 12,3; (2) 12,5; 12,6; (2) 12,7; 13,2; 13,5; 13,6; 13,9.

10 ♀, (3) 12; 12,1; (2) 12,2; 12,3; 13,5; 13,6; 14,2.

Certhiaxis cinnamomea russeola

D'Orbigny y Lafresnaye (1837) la citan para Corrientes por primera vez, sin dar datos precisos del material, ni mencionar localidad.

Contreras (1979) aporta el peso de ejemplares de Paso Mbaracayá y San Cosme.

Alvear, Ea. Santa Ana, 1 ♀, 6 Jun 1962; Cnia. Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 2 ♂, 27 Dic 1962; Ituzaingó, 2 ♂ y 1 ♀, 2 Feb 1960.

Bella Vista, 1 ♀, 18 Oct 1982, col. C. Darrieu, MLP; Manantiales, 1 ♀, 1 Ago 1947, col. T. Apóstol, MLP.

Gónadas: 2 ♂, 6 x 3,5; 6,5 x 3 (Dic.).

1 ♀, 0,5 x 0,5 (Jun).

Asthenes baeri baeri

Dada a conocer para esta provincia por Doering (1874), para el Río Guayquiraró pero sin material coleccionado. Con posterioridad, otros autores la citan en forma general para la provincia, pero sin mención de localidad.

Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 1 ♂ y 1 ♀, 21 Dic 1962; Santa Lucía, Yataity Calle, 1 ♂, 15 Oct 1961; Sauce, 1 ♂ jov, 8 Feb 1960.

Gónadas: 1 ♂, 4 x 2,5 (Dic).

1 ♀, 7 x 3 (Dic).

Phacellodomus ruber

Empedrado, 1 ?, 6 Feb. 1960; Dpto. Itatí, Ea. Tuyutí, 2 ♂ y 2 ♀, 15 Dic 1961; Ituzaingó, 1 ♂, 2 Feb 1960; Cnia. Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 1 ♂, 27 Dic 1962; Saladas, 1 ♂ y 1 ♀, 7 Feb 1960; Santa Lucía, Yataity Calle, 4 ♂ y 3 ♀, 14-15 Oct 1961; Dpto. San Cosme, Santa Ana, 4 ♂ y 8 ♀, 18-19 Dic 1960; San Luis del Palmar, Ao. Riachuelo, 1 ♂ y 2 ♀, 17 Dic 1960; Torrent, barra del Cuay Grande, 1 ♂, 8 May 1962; Torrent, Monte del Cuay Chico, 1 ♂, 8 May 1962.

Bella Vista, 1 ♂, 9 Nov 1987, col. C. Darrieu, MLP; Arroyo Garumbe, 1 ♂, 30 Nov 1948, M. Galvan Col., MLP; Manantiales, 4 ♂ y 1 ♀, 18 Nov 1946, 1-8 Feb y 7 Jun 1947, T. Apóstol col. MLP; Santa Lucía, 80 km. de Bella Vista, 1 ?, 13 Jul 1981, col. C. Darrieu MLP

Gónadas: 8 ♂, 3 x 1; 6 x 3 (May); 6 x 3; 8 x 4; 8 x 6 (Oct); 5 x 3; 5 x 4; 6 x 4 (Dic).

2 ♀, 5 x 4; un huevo formado (Dic).

Coryphistera alaudina

Las únicas citas de localidades correntinas corresponden a Doering (1874) para el Río Guayquiraró, Marelli (1918) para Curuzú Cuatiá y Wilson (1977) para Mercedes.

Mercedes, 10 ♂ y 3 ♀, 25-28 Set, 5-7 Oct 1961; Monte Caseros, Ea. El Centinela, 2 ♂ y 2 ♀, 27 Dic 1959; Cnia. Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 3 ♂, 21 Dic 1962; Sauce, 1 ♂ y 4 ♀, 8 Feb 1960.

Gónadas: 9 ♂, 7 x 4; 9 x 4; 10 x 4; 10 x 6; 12 x 6; 12 x 8 (Oct); 6 x 4; 8 x 4; 10 x 6 (Dic).

1 ♀, 4 x 4 (Oct).

Anumbius annumbi annumbi

Las citas conocidas con anterioridad para esta subespecie son las de Marelli (1918) para Curuzú Cuatiá, Wilson (1977) para Mercedes, y Contreras (1979) para Ea. Ibiratingay.

Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 1 ♀, 17 Abr 1962; Mercedes, 2 ♂, 6 y 7 Oct 1961; Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 1 ♂, 21 Dic 1962; Torrent, Monte del Cuay Chico, 1 ♂, 31 May 1962.

Gónadas: 3 ♂, 6 x 3; 7 x 3 (Oct); 5 x 3 (Dic).

2 ♀, 3 x 1 (Abr); 6 x 2 (May).

Pseudoseisura lophotes argentina

Esta subespecie fue citada con localidad definida por Doering (1874) para el río Guayquiraró, Marelli (1918) para Curuzú Cuatiá y Narosky et al. (1983) para Mercedes.

Po. López, río Corrientes y ruta 12, 1 ♀, 7 Feb 1960; Mercedes, Ea. Rincón del Ombú, 3 ♀, 28 Set, 1 Oct 1961; Paso de los Libres, 1 ♀, 4 May 1961; Colonia Carlos Pellegrini, Ea. El Socorro, 1 ♂, 21 Dic 1962.

Gónadas: 1 ♂, 7 x 4 (Dic).

3 ♀, 9 x 4; un huevo para poner (Set); 13 x 6 (Oct).

Philydor rufosuperciliatus acritus

La primera cita para Corrientes es de d'Orbigny y Lafresnaye (1838) sin especificar localidad y según Hellmayr (1925) basada en un espécimen depositado en el Museo de París.

Ménégaux y Hellmayr (1906) lo citan para la provincia sobre la base de una piel colectada en julio de 1829 sin precisar localidad. Posteriormente, otros autores la citaron para la provincia en general, pero sin mención de localidad.

Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 1 ♀, 30 Mar 1962; Garruchos, 2 ♂ y 2 ♀, 10-19 May 1961; Dpto. Itatí, Ea. Tuyutí, 1 ♂ y 2 ♀, 15-18 Dic 1961; Mercedes, Ea. Rincón del Ombú, 1 ♂ y 2 ♀, 4-8 Oct 1961.

Alrededores de la ciudad de Corrientes, 2 ♀, 25 Nov 1957, col. M. Birabén, Nov 1959, col. I. Apóstol, MLP; Manantiales, 3 ♂ y 1 ♀, 19 Abr, 3 Ago 1947, col. T. Apóstol, MLP; Santa Lucía, 80 Km de Bella Vista, 1 ♀ 14 Jul 1981, col. C. Darrieu, MLP; Gobernador Viraroso, 1 ♀, 21 Mar 1962, col. A. Kovács, MLP.

Gónadas: 2 ♂, 9 x 6 (Oct), 3 x 1 (Dic).

5 ♀, 1 x 1 (Mar), 10 x 4, 1 huevo formado (Oct), 7 x 2, 7 x 3 (Dic).

Peso: 2 ♂, 27,5; 29.

2 ♀, 25,3; 26,4.

Además de las especies mencionadas se hallan en esta colección ejemplares correspondientes a *Synallaxis cinerascens*, *Certhiaxis pyrrhophia pyrrhophia*, *C. sulphurifera*, *Spartonoi-ca maluroides*, *Philydor rufus rufus*, *Xenops rutilans rutilans* y *Sclerurus scansor scansor*, tratadas con anterioridad por Darrieu (1986).

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Contreras, J. R. 1979. Birds weights from northeastern Argentina. Bull. B.O.C. 99: 21-24.
- . 1980-81. Consideraciones sobre las asociaciones interespecíficas de aves Passeriformes de la región selvática costera del alto Río Paraná, en la provincia de Corrientes, Argentina. FACENA 4: 61-75.
- . 1981. Lista preliminar de la avifauna correntina. I. No passeriformes. Hist. Nat. 2: 21-28.
- . 1983. Notas sobre el peso de las aves argentinas. II. Hist. Nat. 3: 39-40.
- . 1987a. Algunas localidades interesantes para aves correntinas. Notul. Faun. 6: 1-2.
- . 1987b. Lista preliminar de la avifauna correntina. II. Passeriformes. Hist. Nat. 7: 61-70.
- . 1984. Addenda a la lista de aves no Passeriformes de la provincia de Corrientes, Argentina. Hist. Nat. 3: 248.
- . y A.O. Contreras. 1987. Notas acerca de la avifauna de la provincia de Corrientes, Argentina. Neotrópica 24: 151-153.
- . y G. Hoy. 1980. El género *Geositta* en Mendoza y algunas consideraciones sobre las razas de *Geositta cunicularia* (Aves: Furnariidae). Hist. Nat. 1: 33-40.
- Darrieu, C.A. 1985. Revisión sistemática de las razas geográficas de *Lepidocolaptes angustirostris*

- (Aves, Dendrocolaptidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral 16: 1-13.
- . 1986. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. III. Nuevos registros de aves Passeriformes (Dendrocolaptidae, Furnariidae, Formicariidae, Cotingidae y Pipridae) y consideraciones sobre su distribución geográfica. Hist. Nat. 6: 93-99.
- . 1987. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. IV. Nuevos registros de aves (Passeriformes: Tyrannidae) y consideraciones sobre su distribución geográfica. Neotrópica 33: 29-35.
- . y A.R. Camperi. 1988. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. V. Passeriformes poco citados (Parulidae, Thraupidae). Neotrópica 34: 133-137.
- Doering, A. 1874. Noticias ornitológicas de las regiones ribereñas del río Guayquiraró (sur de Corrientes). Period. Zool. Argentino 1: 237-258.
- D'Orbigny, A. 1835-1844. Voyage dans l'Amérique meridionale. T. 4, Part. 3: Oiseaux.
- . 1838. Synopsis Avium, II, en Mag. Zool. 8 Cl. II: 1-34.
- . y A. Lafresnaye. 1837. Synopsis Avium, I, en Mag. Zool. 7 Cl. II: 1-88.
- Esteban, J. 1953. Nuevas localidades para aves argentinas. Acta Zool. Lilloana 13: 349-362.
- Fraga, R. y S. Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Hellmayr, Ch. E. 1925. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Part IV. Furnariidae-Dendrocolaptidae. Field Mus. Nat. Hist. 13: 1-390.
- Marelli, C.A. 1918. Aves de Curuzú Cuatiá (Corrientes). Hornero 1:74-40.
- Menegaux, A. y Ch. E. Hellmayr. 1906. Passereaux tracheophones. Mem. Soc. Hist. Nat. Autum 19.
- Narosky, S., R. Fraga y M. de la Peña. 1983. Nidificación de las aves argentinas (Dendrocolaptidae y Furnariidae). Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1983. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte IV. Hist. Nat. 3: 41-43.
- Olrog, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilloana 27: 1-324.
- Short, L.L. 1971. Aves nuevas o poco comunes de Corrientes. República Argentina. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., Zool. 9: 283-309.
- . 1975. A zoogeographic analysis of the South American chaco avifauna. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 154: 1-352.
- Vaurie, Ch. 1980. Taxonomy and geographical distribution of the Furnariidae (Aves, Passeriformes). Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 166: 1-357.
- Wilson, D.B. 1977. Comportamiento de algunas aves de Mercedes (Provincia de Corrientes). Hornero 11: 430-432.

**Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, División Zoología Vertebrados.*