

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Notas sobre aves del sur de Buenos Aires

Narosky, S.; Di Giacomo, A. G.; López Lanús, B. M.

1990

Cita: Narosky, S.; Di Giacomo, A. G.; López Lanús, B. M. (1990) Notas sobre aves del sur de Buenos Aires. *Hornero* 013 (02) : 173-178

[www.digital.bl.fcen.uba.ar](http://www.digital.bl.fcen.uba.ar)

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Buenos Aires

## LITERATURE CITED

- Boersma, P. D. 1987. Penguins oiled in Argentina (Letter). *Science* 236:135.
- Perkins, J.E. 1983. Oiled Magellanic penguins in Golfo San Jose, Argentina. *Marine Pollution Bull.* 14:383-387.
- Scolaro, J.A. 1986. La conservación del pingüino de Magallanes: Un problema de conflicto e intereses que requiere de argumentos científicos. *An. Mus. Hist. Nat. Valparaiso* 17:113-119.

\**Louisiana State University, Nuclear Science Center, Baton Rouge, LA 70803-5820, EE.UU.*

## Notas sobre aves del sur de Buenos Aires

Samuel Narosky\*, Alejandro G. Di Giacomo\*\*  
y Bernabé López Lanús\*\*\*

ABSTRACT.- Notes on the birds of southern Buenos Aires province

From 3-11 November 1988 a survey through the center and southwest regions of Buenos Aires province, was carried out. A total of 156 bird species were recorded, 44 of which were breeding. For 21 of the species ornithogeographic information is provided.

Con motivo de la preparación de un extenso trabajo sobre la avifauna de la provincia de Buenos Aires, se realizó, entre el 3 y el 11 de noviembre de 1988, un viaje por diversas localidades del centro y sudoeste bonaerense.

Se visitaron principalmente restos de bosques, pertenecientes a la provincia del Espinal (Cabrera 1976) o Provincia Chaqueña (Nores 1987).

Entre los lugares recorridos caben destacarse: a) un pequeño bosque de chañar (*Geoffroea decorticans*), situado a pocos kilómetros al este de Tornquist, en el partido homónimo; b) un bosque, de considerable extensión, contiguo a las Salinas Las Barrancas, unos 20 km al noroeste de Médanos, partido de Villarino, con predominio de caldén (*Prosopis caldenia*), algarrobo (*P. flexuosa*), sombra de toro (*Jodina rhombifolia*) y chañar; c) un pequeño bosque, principalmente de caldén, ubicado sobre el camino del Meridiano, que divide a las provincias de B. Aires y La Pampa, al sudoeste de Darregueira, partido de Puán.

Además se realizó una recorrida por las serranías de Curamalán, cordón de Ventania, próximas a Pigüé, partido de Saavedra; con una ascensión al cerro Curamalán.

Se registraron 156 especies, 44 de las cuales fueron halladas nidificando.

En la presente nota se da a conocer información considerada de interés ornitogeográfico sobre 21 especies. Se incluyen además datos inéditos, registrados en la zona con anterioridad, por uno de los autores (Narosky).

*Anhinga anhinga* - Aninga

4 Nov. 1988. Tres ejemplares, dos con plumaje de hembra y un macho, fueron observados posados en postes semisumergidos, a orillas de la ruta provincial 75, en el partido de General Alvear, a pocos kilómetros del Arroyo Vallimanca.

El primer registro de la especie en B. Aires pertenece a Narosky (1969). La mayoría de las

citadas posteriores se refieren a la región ribereña. López Lanús y Roda (1987) la encontraron nidificando en Saladillo.

*Amazonetta brasiliensis*- Pato cutirí

3 Nov. 1988. Un macho observado en Lobos, partido homónimo. Especie citada para el norte y el nordeste de la provincia (Narosky 1978, Olrog 1979).

*Larus dominicanus*- Gaviota cocinera

10 Nov. 1988. Varios ejemplares volaban sobre el campo, desde la provincia de La Pampa hacia B. Aires, cruzando el camino del Meridiano, límite interprovincial, a unos tres kilómetros al oeste de Avestruz, partido de Adolfo Alsina.

La especie no estaba citada para La Pampa (Olrog 1979, Narosky e Yzurieta 1987), pero existe un antecedente inédito de G. B. Siegenthaler, quien incluye a la gaviota cocinera en su "Avifauna de la Laguna Don Tomás y espejos de agua contiguos, Santa Rosa, La Pampa", (trabajo presentado en la 5ª Reunión Argentina de Ornitología, B. Aires, 1984).

*Hydropsalis brasiliana*- Atajacaminos tijereta

10 Nov. 1988. Un macho fue hallado en el bosque de caldén, sobre el camino del Meridiano, cerca de Darregueira, partido de Puán.

Si bien la especie es citada reiteradamente para la provincia, no se cuenta con suficientes registros concretos. Ringuelet y Aramburu (1957) la señalan para Martín García y Punta Lara. Rodríguez Goñi (1984) y Klimaitis y Moschione (1987) indican localidades ribereñas.

*Drymornis bridgesii*- Chinchero grande

23 Nov. 1983. Narosky, Salvador y Saibene, observaron dos ejemplares en el bosque de las Salinas Las Barrancas, próximo a Médanos.

Para la provincia existe un solo registro anterior (White 1882). Las referencias posteriores en Zotta (1944), Ringuelet y Aramburu (1957), etc., son consecuencia de esa cita de White. No obstante esto, en la colección ornitológica del Instituto Miguel Lillo se halla una hembra obtenida por Pierotti en Zárate, en 1957. Además Segura, Moreira y Luciano (com. pers.) observaron un ejemplar en 1983 en Lima, partido de Zárate.

El hallazgo en las proximidades de Médanos sugiere la existencia de otra vía de acceso a la provincia, por el sudoeste, a través del Espinal.

*Lepidocolaptes angustirostris*- Chinchero chico

8 Nov. 1988. Un ejemplar observado y posteriormente otro oído, en el bosque de las Salinas Las Barrancas, cerca de Médanos.

Este registro sugiere también una vía de acceso a B. Aires, siguiendo la Provincia del Espinal.

En la provincia todos los registros conocidos son del norte o de la región ribereña.

*Coryphistera alaudina* - Crestudo

9 Nov. 1988. Dos parejas con nido (uno en construcción y el otro con cinco huevos incubados) en áreas rurales de Argerich, partido de Villarino.

Martínez et al. (1975) citan esta especie entre las aves capturadas en Chasicó, partido de Villarino. Narosky (1978) la incluye en la avifauna bonaerense y posteriormente (1983) señala las localidades de Médanos y Bahía Blanca, donde la halló.

Sería éste el primer registro provincial de un nido con postura para la especie.

*Leptasthenura aegithaloides* - Coludito cola negra

7 Nov. 1988. Una pareja con nido en el chañaral de Tornquist. Es este el registro más septentriona conocido para la nidificación de la especie en la provincia.

Según Narosky (1978) habita el sur de B. Aires.

*Agriornis montana* - Gaucho serrano

6 Nov. 1988. En la ladera del Cerro Curamalán, a 980 m de altura, una pareja de adultos llevaba alimento hasta una profunda grieta entre rocas, en la que se ocultaban 3 jóvenes, que recién comenzaban a volar. El nido parecía haber estado en ese mismo lugar, de acuerdo a los restos hallados.

Este dato confirma la nidificación de la especie en B. Aires, ya señalada en Narosky et al. (1984).

*Xolmis irupero* - Monjita blanca

5 Nov. 1988. En la estancia Curamalal, Cnel. Suárez, fue hallado un nido con 3 huevos incubados.

Al parecer no se conocen registros concretos sobre su nidificación en B. Aires, donde su presencia ha sido señalada reiteradamente.

Pergolani de Costa (1949) menciona, sin indicar localidad ni colector, medidas tomadas de un nido recogido en la provincia.

*Empidonomus aurantioatrocristatus* - Tontilo gris

19 Ene. 1972. Bosque de las Salinas de Barrancas (Narosky e Yzurieta)

15 Dic. 1972. Bosque de las Salinas de Barrancas (Narosky e Yzurieta)

15 Dic. 1972. Carmen de Patagones (Narosky e Yzurieta)

24 Dic. 1986. Bosque del Meridiano (Narosky)

9 Nov. 1988. Argerich (partido de Villarino), (Narosky, Di Giacomo y López Lanús)

27 Dic. 1988. Carmen de Patagones (Narosky, Krapovickas y Pastorino)

La especie, con escasas citas para el norte y la región ribereña de la provincia (Sclater y Hudson 1888, Hartert y Venturi 1909, Klimaitis y Moschione 1987, Narosky inéd.), fue incluida para el nordeste y sudoeste por Narosky (1978), en base a algunos de los registros señalados anteriormente. Estas citas confirman su frecuente hallazgo y su probable nidificación en la zona austral de B. Aires. Por otra parte ya Martínez et al. (1975) la habían incluido en su lista de aves de Chasicó, partido de Villarino.

*Sublegatus modestus* - Suirirí copetón

15 Nov. 1983. Narosky, Salvador y Saibene, en Cardenal Cagliero, partido de Patagones, hallaron un nido con un huevo, el cual constituye el primer registro de nidificación en la provincia.

Los autores observaron, el 8 Nov. 1988, una pareja en el bosque de las Salinas Las Barrancas, cerca de Médanos, y el 10 Nov. 1988, un individuo en el bosque del Meridiano, próximo a Darregucira.

Dabbene (1919) menciona dos ejemplares capturados por Pozzi, en Martín García, siendo al parecer este único registro el que permitió la inclusión de la especie en la avifauna bonaerense (Zotta 1944, Ringuelet y Aramburu 1975, Narosky 1978, Olrog 1979).

*Myiophobus fasciatus* - Mosqueta pecho rayado

7 Nov. 1988. Fueron observados por lo menos dos ejemplares en actitudes nidificadoras, en el casco de la estancia Curamalal, en Cnel. Suárez.

Especie ampliamente registrada en el norte de la provincia y área ribereña, no se conocían citas para el sur bonaerense.

*Polystictus pectoralis* - Tachurí canela

5 Nov. 1988. Una hembra en un pajonal, al pie de la serranía de Curamalán.

Especie escasa en la provincia, citada mayormente para el norte y noreste, salvo los registros de Hartert y Venturi (1909) y Marelli (1933) para Bahía Blanca, y Martelli (1989) para Chapadmalal.

*Prognatopera* - Golondrina parda grande

9 Nov. 1988. En Argerich, partido de Villarino, dos ejemplares en vuelo sobre el campo.

Aunque la especie ha sido citada para Chubut (Chebez 1980), no se conocen registros para el sur y el sudoeste de B. Aires.

*Thraupis bonariensis* - Naranjero

10 Nov. 1988. Pequeño grupo de machos y hembras en el bosque del Meridiano, próximo a Darregueira.

Narosky (1978) lo indica hasta el centro de B. Aires. No se conocen registros para el sur y suroeste de la provincia.

*Saltator aurantiirostris* - Pepitero de collar

8 Nov. 1988. Dos individuos en el bosque de las Salinas Las Barrancas, próximo a Médanos.

Pereyra (1938) y Ringuet y Aramburu (1957) lo señalan para la región norte y ribereña de la provincia. Narosky (1978) menciona el sudoeste y nordeste como área de distribución de la especie en B. Aires; en Narosky e Yzurieta (1987) se indica solo el nordeste. Bó (1965) cita ejemplares de Zelaya, Cristiano Muerto y Sierra de la Ventana.

*Gubernatrix cristata* - Cardenal amarillo

10 Nov. 1988. Pareja con nido en el bosque del Meridiano, cerca de Darregueira.

Especie en grave disminución numérica, constituyendo tal vez este registro de nidificación, el más septentrional conocido en B. Aires.

*Catamenia analis* - Piquitodeoro común

7 Nov. 1988. Un macho en el parque de una escuela rural de Tornquist, fuera de la zona serrana.

Especie citada para las serranías de Curamalán (Narosky et al. 1984).

*Poospiza torquata* - Monterita de collar

14 Abr. 1972 y 19 Oct. 1974. Narosky e Yzurieta observaron varios ejemplares en el bosque de las Salinas Las Barrancas, cerca de Médanos.

Los únicos registros hallados para B. Aires pertenecen a Holland (1893), quien la incluye en un listado de aves migratorias, en la "Estancia Sta. Elena, Media Luna, Soler-F.C. al Pacífico", y a Martínez et al. (1975) para Chasicó, partido de Villarino.

Alejandro y Adrián Di Giacomo hallaron, el 28 Mar. 1986, un ejemplar en una bandada mixta de varios emberzidos, en el área rural de Salto, B. Aires.

*Sturnella defilippi* - Loica pampena

9 Nov. 1988. En un área rural, a orillas de la ruta nacional 35, en las cercanías de Villa Iris,

partido de Puán, fue hallado un grupo disperso de unos 20 ejemplares. Se encontraban en un campo con pastos cortos formando matas aisladas, y en un trisal. Algunos posados en postes del alambrado. Eran notables los vuelos nupciales de los machos, que recuerdan al que efectúa *Sturnella superciliaris*.

Especie en disminución. Antiguamente era una de las más abundantes en las llanuras pampeñas (Sclater y Hudson 1888).

No se conocen registros actuales sobre su presencia en B. Aires, salvo los de Short (1968) y Gochfeld (1979), y una observación de M. Nores (com. pers.), quien en enero de 1979 halló unos cincuenta ejemplares en Necochea.

### AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen la hospitalidad brindada por el Ing. Alfredo Ducós y familia; al Dr. Jorge Navas por permitirnos consultar la colección a su cargo y a los Sres. Fermín Liceaga y Miguel A. Roda por su valiosa colaboración en las tareas de campo.

### BIBLIOGRAFIA CITADA

- Bó, N.A. 1965. Notas preliminares sobre la avifauna del nordeste de San Luis. *Hornero* 10: 215-268.
- Cabrera, A. L. 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. *Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería*. Tomo 2.
- Chebez, J. C. 1980. Sobre la distribución geográfica de tres aves argentinas. *Iguazú* 1: 10-11.
- Dabbene, R. 1919. Notas sobre una colección de aves de la Isla de Martín García. *Hornero* 1: 236-248.
- Gochfeld, M. 1979. Brood parasite and host coevolution: interactions between Shiny Cowbirds and two species of meadowlarks. *Am. Nat.* 113: 885-870.
- Hartert, E. y S. Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. *Novit. Zool.* 16: 159-267.
- Holland, A. H. 1893. Letters on migration in Argentine. *Ibis* 5: 467-469.
- Klimaitis, J. y F. Moschione. 1987. Aves de la reserva integral de selva marginal de Punta Lara y sus alrededores. Ministerio de Economía de la provincia de B. Aires.
- López Lanús, B. y M. A. Roda. 1987. Nidificación de *Anhinga anhinga* en la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 12: 13-14.
- Marelli, C. 1933. Aves observadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 5: 193-199.
- Martelli, A. 1989. Tachurí canela en Chapadmalal. *Nuestras Aves* 19:9.
- Martínez, H. S., M. T. Sorracco y A. D. Bishoff. 1975. Nota preliminar sobre alimentación de aves de la zona de Chasicó (partido de Villarino, Provincia de Buenos Aires). *Dir. Rec. Nat. Min. As. Agrar.*: 1-12.
- Narosky, S. 1969. Presencia de *Anhinga anhinga* en la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 11: 57.
- . 1979. Aves argentinas. Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense. *Asoc. Orn. del Plata*. B. Aires.
- . 1983. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. *Hornero* 12: 122-126.
- ; S. Salvador y C. Saibene. 1984. Especies nuevas o poco citadas para la provincia de Buenos Aires: *Asthenes modesta*, *Agriornis montana*, *Catamenia analis* y *Sicalis lebruni*. *Hornero* 12: 209-211.
- . y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. *Asoc. Orn. del Plata*. B. Aires.
- Nores, M. 1987. Zonas ornitogeográficas de Argentina, en Narosky e Yzurieta (1987).
- Olrog, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana* 27: 1-324.
- Pereyra, J. 1938. Aves de la zona Ribereña Nordeste de la provincia de Buenos Aires. *Mem. Jard. Zool.*

La Plata 9: 1-304.

Pergolani de Costa, M. J. I. 1949. Los *Xolmis* Argentinos. Min. Agr. y Gan. Año 5, Nº 47: 1-32.

Ringuelet, A. y R. Aramburu. 1957. Enumeración Sistemática de los Vertebrados de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Asuntos Agrarios. La Plata.

Rodríguez Goñi, H. 1984. Presencia del atajacaminos coludo en Buenos Aires. Nuestras Aves 4: 8-9.

Slater, P. L. & W. H. Hudson. 1888. Argentine Ornithology. Vol 1: Passeres. R. H. Porter. London.

Short, L. 1968. Sympatry of Red-breasted Meadowlarks in Argentina, and the taxonomy of Meadowlarks (Aves: *Leistes*, *Pezites* and *Sturnella*). Am. Mus. Nov. 2349: 1-30.

White, E. W. 1882. Notes on Birds collected in the Argentine Republic. Proc. Zool. Soc. Lon. Nº XL: 591-629.

Zotta, A. 1944. Lista sistemática de las aves argentinas. Asoc. Orn. del Plata. B. Aires.

\* Av. Hipólito Yrigoyen 4200, 1824 Lanús, Buenos Aires, Argentina

\*\* Suipacha 1111, 1650 San Martín, Buenos Aires, Argentina

\*\*\* Jorge Newbery 2594 1º A, 1426 Buenos Aires, Argentina

### Nuevos hallazgos en Argentina de *Anas discors*, *Lophornis chalybea* y *Tyrannus tyrannus*

Sergio A. Salvador\* y Lucio A. Salvador \*

ABSTRACT - New records in Argentina of *Anas discors*, *Lophornis chalybea* and *Tyrannus tyrannus*. New data on the geographical distribution of 3 species of Argentine birds are given.

#### *Anas discors*:

Esta especie fue registrada por primera vez para Argentina por Navas (1961), en base a un ejemplar capturado en La Rioja; luego Storer y Gill (1961) lo observaron en Buenos Aires. Un tercer ejemplar fue capturado en San Luis (Bo 1965, Masramón 1983). Olrog (1979) cita estas provincias y agrega que fue observado en Santa Fe, y Norez e Yzurieta (1981) lo hallaron en Santiago del Estero.

El 12 de Mayo de 1989 fue capturado un macho de esta especie, a 6 km al noroeste de Etruria, departamento San Martín, Córdoba, por un cazador de la zona. El ejemplar se encontraba en una laguna permanente, de unas 35 ha, junto con una pequeña bandada de *Anas cyanoptera*.

#### *Lophornis chalybea*:

Esta especie fue mencionada para Argentina en base a ejemplares hembras observados por Olrog (1972, 1979) en Villa Gesell, Buenos Aires. Recientemente de la Peña (1988) lo observó en Santa Fe. Narosky e Yzurieta (1987) comentan sobre el registro de un ejemplar del género *Lophornis* en Iguazú, Misiones y agregan que podría tratarse de esta especie o más probablemente de *L. magnifica*.

De *L. chalybea* se observaron dos hembras, el 12 de Diciembre de 1988, en la selva en galería del Riacho Pilagá, departamento Formosa, Formosa. Posteriormente, el 21 de Diciembre de 1988 se vieron 3 individuos, dos hembras y un macho, junto al Arroyo Tabay, a pocos kilómetros de Jardín América, departamento San Ignacio, Misiones. Se los observó capturando insectos en pequeños charcos, próximos a los arroyos, volviendo al mismo lugar a intervalos