
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Myiodynastes chrysocephalus (Pschuvi, 1844), nueva especie para la Argentina López Lanús, B. M. 1992

Cita: López Lanús, B. M. (1992) *Myiodynastes chrysocephalus* (Pschuvi, 1844), nueva especie para la Argentina. *Hornero* 013 (03) : 258-258

Misiones. Si bien ninguno de los autores posteriores tomó en cuenta esta cita se creyó de interés localizar el ejemplar que se encuentra actualmente depositado en el MACN con el No. 35167, y correctamente identificado como *Basileuterus culicivorus*, especie de amplia difusión en Misiones.

En consecuencia la cita de Pereyra (1951) es errónea, como ya lo hacía suponer lo extralimitado del hallazgo para una especie hasta ahora conocida de la nuboselva de Jujuy y Salta (Olrog 1979).

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Dr. J. R. Navas quien nos permitió revisar la colección Partridge del MACN, a T. Narosky quien nos advirtió de la existencia de algunos de los materiales aquí citados, a D. Gallegos y R. Moller Jensen quienes gestionaron la obtención de los manuscritos de W. H. Partridge, a los guardaparques C. Saibene y H. Foerster que amablemente nos cedieron sus observaciones inéditas, a M. Castelino y A. Johnson que respondieron nuestra consulta y al prof. J. Contreras con quien emprendimos la revisión de la avifauna misionera.

BIBLIOGRAFÍA CITADA:

- Belton, W. 1985. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Part 2. Formicariidae through Corvidae. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 180: 1-242.
- Bertoni, A. de W. 1913. Contribución para un Catálogo de las Aves Argentinas. An. Soc. Cient. Arg. 75: 64-102.
- 1939. Catálogos sistemáticos de los vertebrados del Paraguay. Rev. Soc. Cient. Paraguay 4: 3-60.
- Dabbene, R. 1910. Ornitología Argentina. Catálogo sistemático y descriptivo de las aves de la República Argentina. An. Mus. Nac. Bs. As. 18: 1-513.
- Narosky, T. y D. Yzurrieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata. Bs. As.
- Olrog, C. C. 1959. Las aves argentinas, una guía de campo. Univ. Nac. Tucumán, Inst. Miguel Lillo.
- 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Op. Lilloana 9: 1-377.
- 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilloana 27: 1-324.
- Pereyra, J. 1950. Las aves del Territorio de Misiones. An. Mus. Nahuel Huapi 2: 1-40.
- 1951. Avifauna Argentina. (Contribución a la Ornitología) Homero 9: 291-347.
- Sick, H. 1985. Ornitología Brasileira, uma introducao. Vols. I y II. Editora Universidade de Brasilia, Brasilia.
- Zotta, A. 1944. Lista sistemática de las aves argentinas. Tirada de la Asoc. Ornitológica del Plata, Bs. As.

MYIODYNASTES CHRYSOCEPHALUS (PSCHUVI, 1844) NUEVA ESPECIE PARA LA ARGENTINA¹

BERNABÉ M. LÓPEZ LANÚS²

ABSTRACT. The first record of *Myiodynastes chrysocephalus* in Argentina is given, based on an individual seen and undoubtedly identified in Mesón de Condado, Santa Victoria Department, province of Salta. This is the southernmost record species.

Remsen y Taylor (1989) recopilaron la totalidad de las citas de aves de los departamentos de la República de Bolivia. Las especies existentes en Chuquisaca y Tarija no vistas en Argentina serían quince y es probable encontrar algunas de ellas por aproximación no solo geográfica sino por continuación de la provincia biogeográfica de las yungas en nuestro territorio. El departamento de Santa Victoria, provincia de Salta, es limítrofe al de Tarija (Bolivia), separados por el río Bermejo. La vegetación en esta zona es de selva montaña con relieve muy abrupto, ríos correntosos y clima subtropical con estación seca (invierno).

El 26 ene 1991 observé un ejemplar de *Myiodynastes chrysocephalus* en Mesón de Condado, en el río Bermejo, a cinco kilómetros al sur de Condado, depto. de Santa Victoria. La observación duró unos minutos y el ejemplar no se marchó del sector siendo certera la identificación a campo. En estrato alto.

Confiado. Vocalización aguda y quejumbrosa. Se destaca la línea malar parda oscura que resalta en la amplia zona gular ocre blanquecina. Ceja conspicua que no se une en la nuca, blanquecina. Cara parda oscura que hace de línea ocular. Ventral amarillento con leves estrías pectorales insinuadas en los flancos del pecho. Subcaudal ocre blanquecino. Dorso pardo. Corona pardo oscuro. Remeras pardas con bordes de vexilos externos rufos, excepto en las terciarias que los tienen blancos. Pico robusto y ancho, negro. Patas negras.

Esta especie sigue en su distribución las selvas de los primeros contrafuertes montañosos al este de la cordillera de los Andes, desde Panamá (Meyer de Schauensee 1982). Este es el registro más meridional conocido.

AGRADECIMIENTOS:

A T. Narosky y S. Krapovicas por la revisión del texto.

BIBLIOGRAFÍA:

- Meyer de Schauensee, R. 1982. The Birds of South America. C.I.P.A. U.S.A.
- Dunning, J. S. 1982. South American Land Birds. W.W.F. U.S.A.
- Phelps, W. H. y R. Meyer de Schauensee. 1978. Aves de Venezuela. Gráficas Armitano. Caracas.
- Remsen, J.V.Jr. y M.A. Traylor Jr. 1989. An Annotated List of the Birds of Bolivia. Intercollegiate Press, Shawnee Mission, Kansas.

1. Aceptada para su publicación el 4 mar 1992.

2. Quintana 282, 4to. D, 1014 Buenos Aires.