
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Una nueva especie para la avifauna cordobesa y nuevas localidades para otras seis

Biancucci, L.

1995

Cita: Biancucci, L. (1995) Una nueva especie para la avifauna cordobesa y nuevas localidades para otras seis. *Hornero* 014 (01y02) : 076-076

www.digital.bl.fcen.uba.ar

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

UNA NUEVA ESPECIE PARA LA AVIFAUNA CORDOBESA Y NUEVAS LOCALIDADES PARA OTRAS SEIS

LUIS BIANCUCCI¹

ABSTRACT. I report here the presence of a new bird species and give data other 6 species distribution at Córdoba Province, Argentina.

***Amazonetta brasiliensis* Pato Cutirí**

Fueron observados tres ejes. en la laguna Larga (depto. Río Segundo) el 23 may 1989 y otro el 20 ene 1991. También fueron observados dos individuos en el arroyo Carapé (3 km al W de Ascochinga, depto. Colón) en ene 1991. Por último se observaron 23 ejes. en el dique de Macha (6 km al W de Las Peñas, depto. Totoral) el 22 set 1991 y 7 más el 31 oct 1993. Nores *et al.* (1983) citan sólo 4 localidades del N de la provincia.

***Aramides cajanea* Chiricote**

Un ej. observado en la Reserva Provincial Chancaní (depto. Pocho) el 14 ene 1994, en las cercanías de una represa. La especie no posee citas anteriores en la provincia (Stempelmann y Schulz 1890, Olrog 1979, Nores *et al.* 1983), siendo el registro más próximo uno para La Rioja (Nores e Yzurieta 1985).

***Crotophaga ani* Anó Chico**

Tres ejes. fueron observados en Jesús María (depto. Colón) a orillas del río homónimo en dic 1990, nidificaban en la copa de un tala (*Celtis sp.*) a unos 4,5 m de altura. También fue observado un ej. en estancia Santa Elena (8 km al sur de Matorrales, depto. Río Segundo), en un monte que rodea a una laguna, el 21 ene 1992. Nores *et al.* (1983) la citan para el N de la provincia.

***Streptoprocne zonalis* Vencejo de Collar**

Cinco ejes. fueron observados, volando a baja altura sobre un campo con pasturas, en Marull (depto. San Justo) el 13 may 1990. Posteriormente fueron vistos otros dos, también volando a baja altura, sobre un campo arado a 2 km al W de Manfredi (depto. Río Segundo) el 3 oct 1993. Olrog (1963 y 1979) cita la especie, fuera de la época de reproducción, para el N del país hasta Entre Ríos y Córdoba, sin dar localidad; Nores *et al.* (1983) lo señalan sólo para la zona serrana.

***Phacellodomus striaticollis* Espinero Pecho Manchado**

Dos ejes. fueron observados en las proximidades de Las Varillas (depto. San Justo) a orillas de un bañado el 4 ene 1990. También se vio un individuo en cañada Santa Lucía (depto. Marcos Juárez) el 4 ene 1992. La especie había sido citada para los bañados del río Saladillo, cañada del río Pinto, E de la laguna Mar Chiquita y Villa Reducción (Nores *et al.* 1983).

***Pseudocolopteryx acutipennis* Doradito Oliváceo**

Dos individuos observados en la laguna Oncativo (2 km al NW de Manfredi depto. Río Segundo), el 23 dic 1994, en un matorral de *Melilotus albus* cercano a una laguna. Esta pareja fue observada continuamente hasta el 20 ene 1994, esta última vez en compañía de un volantón. El 13 ene 1994 se capturó una hembra en las proximidades del territorio de la pareja. La especie posee citas anteriores en la provincia, pero sólo en la zona serrana y comienzo de la altoserrana (Partridge 1953, Nores *et al.* 1983, Baldo y Ordano 1993). Es la primera vez que se la registra en un ambiente de llanura; Olrog (1979) señala "a lo largo de cursos de agua entre 1000 y 2000 m".

***Cistothorus platensis* Ratona Aperdizada**

Fueron vistos 2 ejes. en Las Tres Cascadas (a 7 km de Ascochinga, Depto. Colón), en un pastizal, el 14 oct 1990. Otros 2 se observaron en estancia La Mónica (20 km al SW de Cañada de Luque, Depto. Totoral) el 28 oct 1993. La distribución conocida de la especie abarcaba la zona altoserrana, el S y el E de la provincia (Nores y Yzurieta 1980).

AGRADECIMIENTOS

A M. Nores que colaboró ampliamente con esta publicación mediante el préstamo de material bibliográfico, la identificación del material capturado y la corrección del manuscrito. A A. Berduc y a R. Buff que colaboraron en algunos de los viajes al campo que resultaron en esta comunicación. A Humedales para las Américas que aportó los fondos para realizar uno de los viajes. A E. Pucheta que ayudó en la confección del abstract.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Baldo, J y M Ordano. 1993. Nuevos registros de aves para Sierra Grande, deptos. San Alberto, Santa María y Punilla, Provincia de Córdoba, República Argentina. Nót. Faunf. 48: 1-5.
- Nores M. y D. Yzurieta. 1980. Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina, Sec.Est. Agr. y Gan. 236 pp.
- Nores M., 1985. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte VI. Hist. Nat. 5: 55-56.
- Nores, M., D. Yzurieta y R. Miatello. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cienc., Córdoba 56: 1-114.
- Olrog, C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Op. Lill. 9: 1-377.
- Olrog, C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lill. 27: 1-324.
- Partridge, W. H. 1953. Observaciones sobre las aves de las provincias de Córdoba y San Luis. Hornero 10: 23-73.
- Stempelmann, H y F. Schulz. 1890. Enumeración de las aves de la Provincia de Córdoba. Bol. Acad. Nac. Cienc., Córdoba 10: 1-18.