
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Primer registro de la Pardela Patas Rosas *Puffinus creatopus* en las costas argentinas

Mazar Barnett, J.; Navas, J. R.
1998

Cita: Mazar Barnett, J.; Navas, J. R. (1998) Primer registro de la Pardela Patas Rosas *Puffinus creatopus* en las costas argentinas. *Hornero* 015 (01) : 043-044

PRIMER REGISTRO DE LA PARDELA PATAS ROSAS *Puffinus creatopus* EN LAS COSTAS ARGENTINAS

JUAN MAZAR BARNETT &

Av. Forest 1531 1°B; (1430) Buenos Aires; Argentina. E-mail: jmbco@ssdnet.com.ar

JORGE R. NAVAS

Museo Argentino de Ciencias Naturales, División Ornitología.
Av. Angel Gallardo 470; (1405) Buenos Aires; Argentina

First record of the Pink-footed Shearwater *Puffinus creatopus* on Argentine coasts

Abstract. While reviewing the seabird collection stored at Museo Argentino de Ciencias Naturales, we found a specimen of the Pink-footed Shearwater *Puffinus creatopus* that had been collected on May 1981 at Punta Conos, golfo San José, Chubut province, by G. Harris. Plumage and measurements agree with those of the species, allowing a straight and clear identification. This is the first record of the species for Argentina, and also for the Atlantic Ocean.

Key words: *Puffinus creatopus*, first record, Argentine coast, Atlantic Ocean.

Palabras clave: *Puffinus creatopus*, primer registro, costa argentina, océano Atlántico.

En la colección ornitológica del Museo Argentino de Ciencias Naturales hemos encontrado un ejemplar de una pardela, género *Puffinus*, que nos llamó sumamente la atención por sus características y su localización geográfica. Dicho ejemplar fue colectado por Guillermo Harris en mayo de 1981 en punta Conos, Golfo San José, Provincia del Chubut (42°20'S, 64°18'W). Tras revisarlo minuciosamente llegamos a identificarlo claramente como *Puffinus creatopus* Coues 1864, Pardela Patas Rosas.

Las medidas del ejemplar en cuestión son las siguientes: cuerda del ala 325, ala chata 330, cola 117, culmen expuesto 41, tarso 56 mm. El sexo no fue determinado por el colector. Su coloración es esencialmente pardo grisáceo oscuro en el dorso y blancuzco en la región ventral; el manto y las cobertoras tienen un ligero ondeado más claro y las remeras y timoneras son como el dorso aunque un poco más oscuras. El detalle más característico que permite identificar la especie es el fino punteado y barrado de pardo grisáceo sobre el fondo blancuzco, que nace en las mejillas y se va transformando en un ondeado que se extiende por los lados del cuello y del pecho y se continúa por los flancos del vientre, bajo el ala y hasta los muslos y el abdomen, con el subcaudal

pardo grisáceo puro con ligeros rebordes blancuzcos. Las axilares son pardo oscuras salpicadas de blancuzco y las cobertoras ventrales del ala manchadas del mismo color pardo. Esto le confiere un característico patrón en el ala ventral. No hay en el rótulo anotaciones del color de las partes desnudas. El pico es marfil amarillento pardusco con el unguis y el interramicornio pardo negruzcos; los tarsos son amarillento pálido, aunque conservan la característica del dedo externo pardo negruzco. En vivo, el pico es rosa amarillento con la punta negruzca y las patas rosa. Las medidas proporcionadas y la descripción del plumaje concuerdan con lo que ha sido publicado para esta especie (Murphy 1936, Johnson 1965, Blake 1977, Marchant & Higgins 1990).

Puffinus creatopus es una especie polimórfica, con un gradiente entre plumajes claros a oscuros. El ejemplar coleccionado en el Chubut parece situarse entre los dos extremos, tal vez más cerca de la forma oscura. La especie se distribuye por las aguas del Océano Pacífico oriental sobre las costas de América del Sur, Central y de los Estados Unidos, llegando casualmente hasta el golfo de Alaska. Nidifica sólo en las islas Robinson Crusoe, Santa Clara y Morro Viñilla, del archipiélago de las Juan Fernández, y la isla

Mocha, Chile, dispersándose en la época no reproductiva hacia el norte. Existen registros aislados en Hawaii, sudeste de Australia y Nueva Zelanda (Carboneras 1992, Harrison 1987).

El presente registro es la primera cita de la especie en aguas del Atlántico y por la fecha del hallazgo es probable que el ave, que presumimos fue encontrada muerta o moribunda en la costa, fuera sólo un individuo errante que habiendo perdido el rumbo hacia las áreas donde pasa la temporada no reproductiva, alcanzara accidentalmente nuestras costas atravesando el pasaje de Drake o quizás a través del continente, cruzando la Patagonia desde el Pacífico llevado por una fuerte tormenta. Bourne (1967) discute el fenómeno de individuos vagantes en varias especies de la familia Procellariidae, aunque no comenta antecedentes para esta especie. La Pardela Patas Rosas ha sido clasificada como Vulnerable (Collar *et al.* 1994).

AGRADECIMIENTOS

A Gabriel Punta y Roberto Schlatter por la revisión crítica del manuscrito. A Mark Pearman

por sus sugerencias y a Marco della Seta por facilitarnos parte de la bibliografía consultada.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- BLAKE, E.R. 1977. Manual of neotropical birds, 1. Chicago: University of Chicago Press.
- BOURNE, W.R.P. 1967. Long-distance vagrancy in the petrels. *Ibis* 109(2): 141-167.
- CARBONERAS, C. 1992. Family Procellariidae (Petrels and Shearwaters). Pp. 216-257 en: del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal, eds. 1992. Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Ostrich to Ducks. Lynx Edicions, Barcelona.
- COLLAR, N.J., M.J. CROSBY & A.J. STATTERSFIELD. 1994. Birds to Watch 2: the World List of Threatened Birds. BirdLife Conservation Series 4. BirdLife International, Cambridge, UK.
- HARRISON, P. 1987. Seabirds of the World: A Photographic Guide. Christopher Helm, London.
- JOHNSON, A.W. 1965. The Birds of Chile and Adjacent Regions of Argentina, Bolivia and Peru. Vol. 1. Platt Establecimientos gráficos, Buenos Aires.
- MARCHANT, S. & P.J. HIGGINS. 1990. Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds. Vol. 1. RAOU/Oxford University Press, Melbourne.
- MURPHY, R.C. 1936. Oceanic Birds of South America. 2 Vols. American Museum of Natural History, New York.

Hornero 15: 44-46, 1998

COMUNICACIONES

PRIMER REGISTRO DEL SAI GRANDE *Oreomanes fraseri* (Passeriformes: Coerebidae? Thraupidae?) EN LA ARGENTINA

JUAN MAZAR BARNETT

Av. Forest 1531 1°B; (1430) Buenos Aires; Argentina. E-mail: jmbco@ssdnet.com.ar

GERMÁN D. PUGNALI & MARCO DELLA SETA

Asociación Ornitológica del Plata; 25 de mayo 749 2°6; (1002) Buenos Aires; Argentina. E-mail: safaris@aorpla.org.ar

First record of the Giant Conebill *Oreomanes fraseri* for Argentina

Abstract. We report the observation of a Giant Conebill *Oreomanes fraseri*, the first record of this species for Argentina, and the southernmost so far. The single bird was seen on 26 September 1997 in the steep-sided quebrada of the rio Peña Negra, about 10 km west of Rodeo Pampa, Salta at ca. 3150 m. Based on colour pattern we assume it was an immature. We found the bird

Recibido el 20/02/98. Aceptado el 22/06/98.